


2259

Bibel/Mag



A T C
0 1
T H E

Technische Hogeschool Eindhoven

Onderafdeling der Wiskunde

Eindige Meetkunde

prof.dr. J.J. Seidel

Wij verzoeken U, dit collegedictaat
niet mee te nemen buiten de leenzaal
en het na lezing terug te leggen op
de ladenkasten. Dank U! —

Dictaatnr. 2.259

Prijs f 5,-

2.259

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

Afdeling Algemene Wetenschappen

Onderafdeling der Wiskunde

EINDIGE MEETKUNDE

Prof. Dr. J.J. Seidel

Najaar 1979

Leeszaal
Centrale Bibliotheek
T.H. Eindhoven

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

Onderafdeling der Wiskunde

BIBLIOTHEEK

8 110169

T.H.EINDHOVEN

EINDIGE MEETKUNDE

J.J. SEIDEL

Najaar 1979

0. Inleiding.


Deze syllabus bedoelt te zijn een inleiding in de Eindige Meetkunde. Een uitputtende behandeling wordt niet nagestreefd. Veeleer wordt getracht de lezers vertrouwd te maken en een eind op weg te helpen met een groot aantal begrippen en onderwerpen, waarna zij worden verwezen naar de literatuur. In het bijzonder wordt gericht op de syllabus Classical groups van Higman [9] en op de boeken van Dembowski [4], Hughes-Piper [11], Gruenberg-Weir [5] en Hirschfeld [10].

Het uitgangspunt (Hoofdstuk 1) wordt gevormd door een ruimtelijke benadering van de klassieke configuraties van Desargues en Pascal. In Hoofdstuk 2 wordt de projectieve meetkunde geïntroduceerd via de structuur der deelruimten, zowel axiomatisch als met behulp van vectorruimten over een (eindig) lichaam. De theorie der projectieve vlakken wordt ingeleid in Hoofdstuk 3, met het accent op de combinatorische eigenschappen. Een aantal begrippen, zoals spreads, Baer subvlakken, Singer cycles, niet-Desarguese vlakken, translatievlakken, wordt toegelicht door voorbeelden. Met enige uitvoerigheid wordt in Hoofdstuk 4 de polaire meetkunde behandeld, met speciale aandacht voor de combinatorische toepassingen van de symplectische, unitaire en orthogonale meetkonden (ook van karakteristiek 2). Hoofdstuk 5 is gewijd aan kwadratische verzamelingen zoals ovalen en ovoiden. Ook de lijnen meetkunde, de Tits-ovoiden en de meetkonden van Möbius en Hjelmslev komen aan de orde. De samensteller is dankbaar voor de goede raad van vele collegas in binnen- en buitenland. In het bijzonder vermeldt hij de medewerking van A. Blokhuis en W. Haemers.

1. Klassieke configuraties.

1.1. De configuratie van Desargues (1593-1662).

Beschouw vijf punten 1,2,3,4,5 in de ruimte, waarvan geen viertal coplanair is (d.w.z. op één vlak ligt). De tien paren der punten bepalen tien rechten, de tien trijels tien vlakken. Als we dit geheel snijden met een niet ongeschikt vlak (een vlak dat geen van de vijf punten bevat en niet evenwijdig loopt met een van de lijnen of vlakken) dan ontstaat de configuratie van Desargues :



Deze configuratie ligt ten grondslag aan de volgende stelling: Laten in een vlak twee perspectivisch gelegen driehoeken gegeven zijn (d.w.z. de verbindingslijnen van "overeenkomstige" hoekpunten gaan door één punt, het perspectiviteitscentrum), zeg de driehoeken $13, 14, 15$ en $23, 24, 25$ met perspectiviteitscentrum 12 ,

dan liggen de snijpunten 34,35,45 van de corresponderende zijden van deze driehoeken op een rechte (de perspectiviteitsas).

Dit is de stelling van Desargues. Het bewijs verloopt als volgt. Richt een of andere rechte op in het punt 12 (niet in het vlak) en kies daarop willekeurig twee punten 1 en 2. Bepaal nu de volgende punten:

$$3 := (1 \cup 13) \cap (2 \cup 23), \quad 4 := (1 \cup 14) \cap (2 \cup 24) \quad \text{en} \\ 5 := (1 \cup 15) \cap (2 \cup 25).$$

De vijf punten 1,2,3,4,5 bepalen nu in het vlak een configuratie van Desargues, die precies gelijk is aan de oorspronkelijke figuur. Hieruit volgt dat 34,45,53 op een rechte liggen.

1.2. Opmerkingen.



1.2.1. Bij de constructie hebben wij slechts gebruik gemaakt van de projectieve bewerkingen \cap = snijden en \cup = verbinden.

1.2.2. Bij het bewijs hebben wij gebruik gemaakt van het feit dat ons vlak zich in de ruimte bevindt. Een platlander zou dit bewijs niet kunnen geven. (Een gevolg hiervan is dat in een projectief vlak, dat gelegen is in een ruimte met meer dan twee dimensies de stelling van Desargues geldt; er zijn echter projectieve vlakken waarin deze stelling niet geldt, zoals we later zullen zien.)

1.2.3. Kiezen we het snijvlak "ongeschikt" dan ontstaan bijzondere gevallen van de stelling.



(i) snijvlak // 345 .

(ii) snijvlak // 12 .



In het eerste geval komt de stelling van Desargues neer op de pyramide-eigenschap: als $PR \parallel P'R'$ en $RQ \parallel R'Q'$, dan $PQ \parallel P'Q'$.

1.2.4. Neem het snijvlak door $12 \cap 345$. Dan ligt het perspectiviteitscentrum (12) op de perspectiviteitsas (345). We noemen de perspectiviteit in dit geval een elatie (in het andere geval een homologie). In het geval $12 \parallel 345$ komen het centrum zowel als de as in oneindig te liggen en lopen dus alle overeenkomstige lijnen parallel; we hebben dan een translatie. De stelling van Desargues komt nu neer op de prisma-eigenschap: als $PP' \parallel QQ' \parallel RR'$ en $PR \parallel P'R'$, $RQ \parallel R'Q'$, dan $PQ \parallel P'Q'$.



De stelling van Desargues impliceert dus de prisma-eigenschap, omgekeerd echter niet: het is mogelijk dat in een projectief vlak de prisma-eigenschap geldt, maar de stelling van Desargues niet.


1.2.5. Als van twee driehoeken de verbindingslijnen der corresponderende hoekpunten door één punt gaan, dan liggen de snijpunten der corresponderende zijden op één lijn.

Als we de duale uitspraak bekijken (we vervangen punt door lijn en omgekeerd) dan krijgen we het omgekeerde van de stelling van Desargues:


Als van twee driehoeken de snijpunten der corresponderende zijden op een lijn liggen, dan gaan de verbindingslijnen der corresponderende hoekpunten door één punt. (De operaties snijden en verbinden, \cap en \cup worden bij dualiseren ook verwisseld.)

1.2.6. Opgave. Leg een verband tussen de configuratie van Desargues en de Petersen-graaf. Laat zien dat hieruit volgt dat de Petersen-graaf $\text{Sym}(5)$ als groep van automorfismen heeft.

1.3. De zeshoeken van Pascal (1623-1662) en Pappus (250-300).



PASCAL



PAPPUS

Beschouw zes punten 12, 23, 34, 45, 56, 61 op een kegelsnede (resp. op twee rechten in een vlak). Dan liggen de snijpunten 123/456, 234/561, 345/612 op een rechte.

Voor het bewijs construeren wij een ruimtelijke zeshoek 1,2,3,4,5,6 van Dandelin (1794-1849), waarvan de zijden op een eenbladige hyperboloïde liggen. Elke eenbladige hyperboloïde bevat twee stelsels S en T van rechten. Twee rechten van hetzelfde stelsel kruisen; twee rechten van verschillende stelsels snijden (of zijn evenwijdig): Laat de hyperboloïde gegeven zijn door de vergelijking

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

laat de lijnen van stelsel S bepaald worden door

$$s_1 \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c} \right) = s_2 \left(1 - \frac{y}{b} \right),$$


$$s_2 \left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c} \right) = s_1 \left(1 + \frac{y}{b} \right);$$

en de lijnen van het stelsel T door

$$t_1 \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c} \right) = t_2 \left(1 + \frac{y}{b} \right),$$

$$t_2 \left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c} \right) = t_1 \left(1 - \frac{y}{b} \right);$$

De zeshoek van Dandelin ontstaat nu als volgt. Beschouw een hyperboloïde door de gegeven kegelsnede (resp. door de beide gegeven rechten). Neem de rechten van het stelsel S door de punten 12, 34, 56 en die van T door de punten 23, 45, 61. Noem de verkregen snijpunten 2, 3, 4, 5, 6, 1.



Bekijken we vervolgens

$$P := 12 \cap 45, \quad Q := 23 \cap 56,$$

$$R := 34 \cap 61,$$

dan zien we dat

$$123 \cap 456 = PQ,$$

$$234 \cap 561 = QR,$$

$$345 \cap 612 = RP.$$

De snijpunten van PQ, PR en QR met het vlak van de ellips liggen op een rechte omdat de lijnen PQ, PR en QR


in één vlak liggen. Maar deze snijpunten zijn juist gelijk aan de drie snijpunten uit de stelling.

Opgave. Dualiseer de stelling van Pascal. (Bedenk dat dualisering van een kegelsnede (verzameling van punten) weer een kegelsnede (nu een verzameling van raaklijnen) oplevert.) Het resultaat van de dualisering is de stelling van Brianchon (1783-1864).

De stelling van Pappus impliceert de stelling van Desargues, het omgekeerde geldt alleen in het eindige geval.

(Zie [14]).

Een bijzonder geval van de Stelling van Pappus ontstaat wanneer de corresponderende lijnen parallel lopen, de drie 'snijpunten' komen dan op de oneindige rechte te liggen.



$$123 \parallel 456,$$

$$234 \parallel 561,$$

$$345 \parallel 612.$$

2. Projectieve meetkunde.


2.1. Projectieve ruimten.

Een projectieve ruimte is een paar $(\mathcal{P}, \mathcal{L})$ bestaande uit een verzameling \mathcal{P} (de punten) en een collectie \mathcal{L} (de lijnen) van deelverzamelingen van \mathcal{P} zodat aan de volgende drie eigenschappen is voldaan.

PG 1. Elk tweetal (verschillende) punten ligt op één lijn.

PG 2. Elke lijn bevat tenminste 3 punten.

PG 3. Het axioma van Pasch: Als twee lijnen l en m elkaar snijden in een punt C , en A, D zijn twee van C verschillende punten van l , B, E twee van C verschillende punten van m , dan hebben de lijnen AB en DE een snijpunt.



Opmerking: Axioma's zijn binnen een wiskundige theorie op te vatten als "spelregels", de bedoeling is natuurlijk wel dat het spel dat je gaat spelen iets met de werkelijkheid te maken heeft; het zijn echter geen van hogerhand vastgestelde "eeuwige" waarheden.

Een deelruimte van een projectieve ruimte $(\mathcal{P}, \mathcal{L})$ is een deelverzameling $\alpha \subset \mathcal{P}$ met de eigenschap:

$$\forall P \in \mathcal{P} : \forall Q \in \mathcal{P} \forall R \in P \cup Q : ((P \in \alpha, Q \in \alpha) \Rightarrow R \in \alpha)$$

D.w.z. als een deelruimte twee punten bevat, dan bevat hij de hele lijn door die twee punten.

Met de bijbehorende lijnen is de deelruimte zelf weer een projectieve ruimte. Voorbeelden van deelruimten

zijn:



$$\emptyset, \{P\} \text{ voor } P \in \mathcal{P}, \{P | P \in I\} \text{ voor } I \in \mathcal{L}.$$

Drie punten die niet op een lijn liggen bepalen een vlak (alle $X \in \mathcal{P}$ op $P_1 \cup S$, $S \in P_2 \cup P_3$ en de bijbehorende lijnen), 4 niet in een vlak liggende punten bepalen een 3-ruimte (alle $X \in \mathcal{P}$ op $P_4 \cup S$, $S \in P_1 \cup P_2 \cup P_3$), etcetera. Een hypervlak is een maximale echte deelruimte. Een projectieve meetkunde is de verzameling van alle deelruimten van een projectieve ruimte. Hieruit ontstaat een affiene meetkunde wanneer uit elke deelruimte de doorsnede met een gegeven hypervlak wordt weggelaten (onze "gewone" ruimte is een affiene ruimte, het vlak dat is "weggelaten" is het vlak in het oneindige).

Een verzameling van $d+1$ elementen met al zijn deelverzamelingen is op te vatten als een "magere" projectieve meetkunde (vervang PG 2 door: elke lijn bevat tenminste twee punten). De lijnen zijn de paren elementen (de vlakken de drietallen, de hypervlakken de d -tallen etcetera). (Zie [21]). Ga na dat aan het axioma van Pasch voldaan wordt omdat de voorwaarden leeg zijn.

De deelruimten van een projectieve meetkunde vormen een lattice (rooster), waarin $\alpha \cap \beta$ de doorsnede en $\alpha \cup \beta$ de kleinste omvattende deelruimte van de deelruimten α en β is, en waarin de projectieve ruimte \mathcal{P} zelf de grootste en \emptyset de kleinste deelruimte is.

Deze lattice is atomair (een punt heeft slechts \emptyset als echt deel), **gecomplementeerd** ($\forall x \exists x': (x \cup x' = \mathcal{P}, x \cap x' = \emptyset)$), en modulair, d.w.z. er bestaat geen Euclidische deellattice:




Omgekeerd is elke atomaire, gecomplementeerde, modulaire lattice een (eventueel magere) projectieve meetkunde. (zie [20], p. 139).

Een vlag is een stelsel deelruimten

$$\emptyset = D_{-1} \subset D_0 \subset D_1 \subset \dots \subset D_{i-1} \subset D_i \subset \dots \subset \mathcal{P}$$

zodat, voor $i=0,1,2, \dots$, elke D_{i-1} een echte deelruimte is van D_i , en geen echte deelruimten tussen D_{i-1} en D_i bestaan.



$$\emptyset \subset \mathcal{P} \subset l \subset \alpha \subset \dots$$

Wij beperken ons tot projectieve meetkunden \mathcal{P} met eindige vlaggen; van een projectieve meetkunde heeft elke vlag dezelfde lengte $=: 1 + \dim \mathcal{P}$. Voor de deelruimten D en E van \mathcal{P} geldt:

$$\dim D + \dim E = \dim D \cup E + \dim D \cap E.$$

Voor het bewijs van de volgende stelling verwijzen we naar de redenering in 1.1.

Stelling. Als een projectieve ruimte dimensie groter dan 2 heeft, dan geldt de stelling van Desargues voor elk deelvlak.

We zullen echter projectieve vlakken ontmoeten waarvoor de stelling van Desargues niet geldt. Zulke projectieve vlakken kunnen dus niet als deelvlak worden ingebed in in projectieve ruimte van dimensie meer dan 2.


Projectieve ruimten waarin de stelling van Desargues geldt kunnen worden gecoördinatiseerd met behulp van een scheef lichaam, en met behulp van een lichaam wanneer de projectieve ruimte eindig is (d.w.z. een eindig aantal punten bevat). Deze aankondiging legaliseert de volgende paragraaf.

2.2. Projectieve ruimten over een lichaam.

Zij $V(d+1, \mathbb{F})$ een vectorruimte van dimensie $d+1$ over een lichaam \mathbb{F} . De lineaire deelruimten van $V(d+1, \mathbb{F})$ vormen een projectieve meetkunde van dimensie d . Inderdaad, noem de 1-dimensionale lineaire deelruimten de projectieve punten en de 2-dimensionale lineaire deelruimten de projectieve lijnen. De projectieve punten en lijnen voldoen aan de axioma's (ga na!) PG 1,2,3. De aldus verkregen projectieve ruimte wordt genoteerd met $PG(d, \mathbb{F})$. Als \mathbb{F} het eindige Galoislichaam $\mathbb{F}_q = GF(q)$, $q = p^k$, p priem is dan schrijven we ook wel $PG(d, q)$. De magere projectieve meetkunde op $d+1$ punten zou dan kunnen genoteerd met $PG(d, 1)$ (Dit wordt later nog toegelicht).

In $PG(d, \mathbb{F})$ geldt de stelling van Desargues, ook voor $d=2$. Inderdaad, $PG(2, \mathbb{F})$ kan worden ingebed in $PG(3, \mathbb{F})$.

Zij H een lineaire deelruimte van $V(d+1, \mathbb{F})$. De flat door $p \in V$ en evenwijdig aan H is de verzameling $\{p + \underline{h} \mid \underline{h} \in H\}$. Selecteer in $V(d+1, \mathbb{F})$ een hypervlak H en een flat $A // H$, $A \neq H$. De doorsneden van A met de lineaire deelruimten in $V(d+1, \mathbb{F})$ zijn flats. Omdat $A \cap H = \emptyset$ vormen deze flats een affiene meetkunde, aan te duiden met $AG(d, \mathbb{F})$.



$$\pi \cap A = p$$

$$\alpha \cap A = p$$

Projectieve lijnen en punten (zoals α en π) corresponderen met affiene lijnen en punten in A (zoals a en p), behalve de lijnen en punten in H !

Voor een eindig lichaam \mathbb{F}_q kunnen de aantallen deelruimten worden geteld. Wij bepalen eerst het aantal lineaire deelruimten van dimensie m van de vectorruimte $V(n, q)$, $m \leq n$. Het aantal verzamelingen van m lineair onafhankelijke vectoren in $V(n, q)$ is

$$(q^n - 1)(q^n - q)(q^n - q^2) \dots (q^n - q^{n-1}).$$

Van deze verzamelingen bepalen echter steeds

$$(q^m - 1)(q^m - q) \dots (q^m - q^{m-1})$$

dezelfde lineaire deelruimte $V(m, q)$. Het quotiënt van deze uitdrukkingen is dus het aantal der $V(m, q)$ in $V(n, q)$. Dit quotiënt noteren wij met behulp van de q -analoge van de faculteit (!) en van de binomiaalcoëfficiënt $\binom{n}{m}$:

$$n!_q := (q-1)^{-n} (q^n - 1)(q^{n-1} - 1) \dots (q-1), \quad \begin{bmatrix} n \\ m \end{bmatrix}_q := \frac{n!_q}{m!_q (n-m)!_q}.$$

Deze definities worden gelegaliseerd door de limieten:

$$\lim_{q \rightarrow 1} n!_q = n!, \quad \lim_{q \rightarrow 1} \begin{bmatrix} n \\ m \end{bmatrix}_q = \binom{n}{m}.$$

Stelling. Het aantal lineaire deelruimten $V(m, q)$ in $V(n, q)$, $m \leq n$, bedraagt $\begin{bmatrix} n \\ m \end{bmatrix}_q$.

Als geen verwarring optreedt laten wij de index q weg.

Stelling. Het aantal e -dimensionale deelruimten in $PG(d, q)$ bedraagt $\begin{bmatrix} d+1 \\ e+1 \end{bmatrix}$. (Als we $q=1$ nemen krijgen we dus precies het aantal e -dimensionale deelruimten van een magere PG)
Het aantal e -dimensionale flats in $AG(d, q)$ bedraagt $q^{d-e} \begin{bmatrix} d \\ e \end{bmatrix}$.

Het tweede deel van deze stelling is in te zien door eerst het aantal flats te nemen dat door de oorsprong gaat en vervolgens te bedenken dat een klasse evenwijdige e -flats uit q^{d-e} elementen bestaat.

Stelling. De $V(1, q)$ en de $V(m, q)$ van een $V(n, q)$, $m \leq n$, vormen de punten en de blokken van een $2-(\begin{bmatrix} n \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} m \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} n-2 \\ m-2 \end{bmatrix})$ design. Dit design is symmetrisch d.e.s.d.a. $m=n-1$.

2.3. Spreads.

Een t-spread in $PG(n, q)$ is een collectie van t -deelruimten zodat elk punt van $PG(n, q)$ ligt in één t -deelruimte. Een nodige (en ook voldoende) voorwaarde voor het bestaan van een t -spread in $PG(n, q)$ is

$$\frac{q^{t+1}-1}{q-1} \mid \frac{q^{n+1}-1}{q-1}, \text{ dat is, } t+1 \mid n+1.$$

Opgave: vind een spread van 5 lijnen in $PG(3, 2)$.

In het bijzonder bestaan in $PG(2d-1, q)$ spreads van q^d+1 deelruimten van dimensie $d-1$. Zo'n spread kan als volgt worden geconstrueerd. In termen van vectorruimten is het probleem: het vinden in $V(2d, q)$ van een stelsel van q^d+1 lineaire deelruimten van dimensie d , die (na weglating van 0) een partitie vormen van $V \setminus \{0\}$. We kunnen $GF(q^{2d})$ beschouwen als een vectorruimte van dimensie 2 over $GF(q^d)$. De verzameling W der lineaire deelruimten van dimensie 1 vormt een partitie (laat 0 weg). Als $GF(q^{2d})$ wordt beschouwd als een vectorruimte van dimensie $2d$ over $GF(q)$, dan vormen de elementen van W disjuncte deelruimten van dimensie d over $GF(q)$ en de gevraagde spread is verkregen.

Elke $(d-1)$ -spread in $PG(2d-1, q)$ is als volgt te beschrijven. Zij $U = U(d, q)$, en zij $V = U \times U$. Definieer, voor $i = 3, \dots, q^d+1$:

$$W_1 = U \times 0, W_2 = 0 \times U, W_i = \{(x, T_i(x)) \mid x \in U\},$$

waarin $T_i: U \rightarrow U$ een niet-singuliere lineaire transformatie is. Dan geldt het volgende (bewijs dit!)

(i) W_1, \dots, W_{q^d+1} is een spread d.e.s.d.a. $T_j^{-1}T_i$

heeft geen fixpunt voor $i \neq j$.

(ii) W_1, \dots, W_{q^d+1} is spread $\Leftrightarrow T_i - T_j$ is niet singulier voor $i \neq j$.

2.4. Collineaties.

Een collineatie van de projectieve ruimte $(\mathcal{P}, \mathcal{L})$ is een permutatie σ van \mathcal{P} zodat $\mathcal{L}^\sigma = \mathcal{L}$. Een collineatie beeldt deelruimten af op deelruimten van dezelfde dimensie. De collineaties vormen een groep, genaamd Coll.

Een collineatie σ heet een centrale collineatie als

$$\exists C \in \mathcal{P} \forall \ell \in \mathcal{L} ((C \in \ell) \Rightarrow (\ell^\sigma = \ell)).$$

Dan gaat elke deelruimte door C (het centrum) in zichzelf over. Voorts bestaat er een hypervlak (de as) waarvan elk punt in zichzelf overgaat. Inderdaad, als H en K hypervlakken, niet door C , zijn dan voldoet

$$(H \cap H^\sigma) \cup (K \cap K^\sigma).$$

Stelling. Een collineatie heeft een centrum dan en slechts dan als hij een as heeft.

Een centrale collineatie heet een elatie (homologie) wanneer centrum en as incident (niet incident) zijn. De elaties genereren een groep, de centrale collineaties genereren een groep. Duidelijk is dat


$$\langle \text{elaties} \rangle \leq \langle \text{centr. collin.} \rangle \leq \text{Coll}.$$

Wanneer de projectieve ruimte ligt in een projectieve ruimte van een hogere dimensie (dit kan alleen misgaan als de dimensie twee is), dan is elke centrale collineatie σ als volgt te construeren.

Neem de punten 1 en 2 op een lijn door het centrum en neem het hypervlak α door de as. Bij elke $P \in \mathcal{P}$ construeert men P^σ volgens

$$(P \cup 1) \cap \alpha = S, \quad (2 \cup S) \cap \mathcal{P} = P^\sigma.$$

Voorts: $C^\sigma := C$. Elk punt van de as is vast onder σ .



Opgave. Toon aan dat σ een collinatie is. Herken de constructie van Desargues van § 1.1.

Beschouw nu weer de vectorruimte $V = V(n, \mathbb{F})$ en de daarbij behorende projectieve ruimte $PG(n-1, \mathbb{F})$. Zij $\bar{} \in \text{Aut } \mathbb{F}$. Een semilineaire afbeelding van V is een afbeelding $\sigma : V \rightarrow V$ zodat

$$(x+y)^\sigma = x^\sigma + y^\sigma \quad , \quad (\lambda x)^\sigma = \bar{\lambda} x^\sigma \quad ,$$

voor alle $x, y \in V$, $\lambda \in \mathbb{F}$. Zij $\Gamma L(V)$ de groep van de niet singuliere semilineaire afbeeldingen van V , dat is, de groep van alle transformaties

$$(x_1, x_2, \dots, x_n)^\sigma = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)A \quad , \quad \det A \neq 0 \quad .$$

De algemene lineaire groep $GL(V)$ is de groep van de niet singuliere lineaire afbeeldingen van V :

$$(x_1, x_2, \dots, x_n)^\sigma = (x_1, x_2, \dots, x_n)A \quad , \quad \det A \neq 0 \quad .$$

De speciale lineaire groep $SL(V)$ is de groep van alle

$$(x_1, x_2, \dots, x_n)^\sigma = (x_1, x_2, \dots, x_n)A \quad , \quad \det A = 1 \quad .$$

De lineaire afbeelding $\tau : V \rightarrow V$ gegeven door

$$x^\tau = x + \varphi(x)c, \quad c \in V, \quad \varphi \in V^*,$$

heet een dilatatie als $\varphi(c) \notin \{0, -1\}$, en een transvectie als $\varphi(c) = 0$.

$SL(V)$ wordt voortgebracht door de transvecties; $GL(V)$ wordt voortgebracht door de dilataties en de transvecties. Inderdaad, ten opzichte van een geschikte basis is de matrix van een transvectie $I + aE_{ij}$, $i \neq j$, en is de matrix van een dilatatie $I + \varphi(c)E_{ii}$.

In $PG(n-1, \mathbb{F})$ induceert elke niet-singuliere semi-lineaire afbeelding een collineatie, induceert elke dilatatie een homologie, en induceert elke transvectie een elatie. Voor de groepen geldt:

$$\begin{array}{ccccc} \langle \text{elaties} \rangle & \leq & \langle \text{centr. collin.} \rangle & \leq & \text{Coll PV} \\ \parallel & & \parallel & & \parallel \\ \text{PSL}(V) & \leq & \text{PGL}(V) & \leq & \text{P}\Gamma\text{L}(V) \end{array}$$

Voor bijzonderheden verwijzen wij naar (9), hoofdstuk 2 "The general linear group", en naar (4). In deze referenties worden ook de ordes van de groepen bepaald, in het geval $\mathbb{F} = \mathbb{F}_q$, $q = p^e$, p priem (Ga na!)

$$q^{\frac{1}{2}n(n-1)}(q-1)^n n^q = |GL(n, q)| = (q-1) |PGL(n, q)|,$$

$$\frac{1}{e} |\Gamma L(n, q)| = |GL(n, q)| = (q-1) |SL(n, q)|,$$

$$\frac{1}{e} |P\Gamma L(n, q)| = |PGL(n, q)| = |PSL(n, q)| \times \text{ggd}(n, q-1).$$

3. Projectieve en affiene vlakken.

3.1. Het projectieve vlak.

Een projectief vlak is een projectieve meetkunde $(\mathcal{P}, \mathcal{L})$ zodat

PG 1'. Elk tweetal verschillende punten ligt op één lijn.

PG 2'. Elk tweetal verschillende lijnen heeft één punt gemeen.

PG 3'. Er zijn 4 punten, waarvan geen drie op een lijn liggen.

Een projectief vlak is een projectieve ruimte van dimensie 2. Een eindig projectief vlak is een $2-(n^2+n+1, n+1, 1)$ design en wordt genoteerd met $PG(2, n)$. De parameter n heet de orde van $PG(2, n)$.

Stelling (Bruck-Ryser). Nodig voor het bestaan van een $PG(2, n)$ is dat

$$(n \equiv 1 \text{ of } 2 \pmod{n}) \implies (n = u^2 + v^2; u, v \in \mathbb{Z}).$$

Voor het bewijs van deze belangrijke stelling, zie [1], 87-89. $PG(2, n)$ bestaat voor $n = 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13$, niet voor $n = 6, 14$ terwijl het bestaan van $PG(2, 10)$ en $PG(2, 12)$ niet bekend is.

Voor een collineatie $\sigma \in \text{Coll} \cong \Gamma$ van het projectieve vlak $(\mathcal{P}, \mathcal{L})$ is $\text{Fix } \sigma := \{P \in \mathcal{P} \mid P^\sigma = P\}$.

Opgave. Wanneer voor een collineatie σ $\text{Fix } \sigma$ vier punten bevat waarvan geen drie collineair zijn, vormt $\text{Fix } \sigma$ een subvlak.

Een centrale collineatie σ is gedefinieerd door

$$\exists c \in \mathcal{P} \forall l \in \mathcal{L} ((c \in l) \implies (l^\sigma = l)).$$

Dan geldt ook

$$\exists a \in \mathcal{L} : \forall P \in \mathcal{P} \cdot ((P \in a) \Rightarrow (P^\sigma = P)).$$


Voor centrum $C \in \mathcal{P}$ en as $a \in \mathcal{L}$ definiëren wij

$$\Gamma(C, a) := \{ \sigma \in \Gamma \mid \sigma \text{ heeft centrum } C \text{ en as } a \}.$$

Voor gegeven C, a, P, Q bestaat er ten hoogste één

$\sigma \in \Gamma(C, a)$ zodat $P^\sigma = Q$. Een projectief vlak heet (C, a) -transitief als $\Gamma(C, a)$ transitief is op de niet vaste punten van een lijn $\neq a$ door C (hij is dan ook transitief op de lijnen $\neq a$ door C).

Stelling. Een projectief vlak is (C, a) -transitief iff de (C, a) -stelling van Desargues geldt.




Inderdaad, bij gegeven C, a, P, Q definieer de 1-1 afbeelding σ zoals aangegeven is in de tekening. Dan is σ een collineatie iff voor alle X en Y geldt

$$(X \cup Y) \cap a = (X^\sigma \cup Y^\sigma) \cap a.$$

Dit komt neer op de stelling van Desargues voor centrum C en as a .

Stelling. Als een projectief vlak (C, a) -transitief en (D, a) -transitief is met $C \neq D$, dan is het ook (A, a) -transitief voor elke $A \in C \cup D$.



Inderdaad, construeer $\delta_\gamma \in \Gamma(\Lambda, a)$ bij $\gamma \in \Gamma(C, a)$ en $\delta \in \Gamma(D, a)$ zoals hierboven aangegeven.

Een projectief vlak heet een translatievlak t.o.v. de as a , wanneer het (C, a) -transitief is voor elke $C \in a$.

Een projectief vlak heet een Moufang vlak wanneer het translatievlak is t.o.v. elke lijn.

Opmerking. Lenz en Barlotti klassificeerden alle mogelijkheden voor (C, a) -transitiviteiten van een projectief vlak, zie [4] p. 126.

3.2. Baer subvlakken, Singer cycles

Zij $\pi = (\mathcal{P}, \mathcal{L})$ een projectief vlak van de orde n , en zij $\pi' = (\mathcal{P}', \mathcal{L}')$ een projectief vlak van de orde m , waarbij $\mathcal{P}' \subset \mathcal{P}$ en $\mathcal{L}' \subset \mathcal{L}$. Dan heet π' een subvlak van π . Zij π' een echt subvlak van π .

Stelling. Als elk punt van \mathcal{P} ligt op een lijn van \mathcal{L}' dan geldt: $m^2 = n$; als dit niet zo is: $m^2 + m \leq n$.

Bewijs. Als $P \in \mathcal{P}$ op geen enkele lijn van \mathcal{L}' ligt, dan bevat elk der $n+1$ lijnen uit \mathcal{L} door P ten hoogste één punt uit \mathcal{P}' . Anderzijds is elke $P' \in \mathcal{P}'$ verbonden met P door een lijn uit \mathcal{L} . Hieruit volgt dat $m^2 + m + 1 \leq n + 1$. Neem nu aan dat elke $P \in \mathcal{P}$ ligt op een $\ell' \in \mathcal{L}'$. Dan wordt $\mathcal{P} \setminus \mathcal{P}'$ door de lijnen uit \mathcal{L}' verdeeld in disjuncte klassen van elk $n - m$ punten:

$$n^2 + n + 1 - (m^2 + m + 1) = (n - m)(m^2 + m + 1), \quad (n - m)(n - m^2) = 0. \quad \square$$

In het eerste geval, dus als $m^2 = n$, heet π' een Baer-subvlak.

Wij lichten dit toe met de Baer-subvlakken $PG(2, \mathbb{F}_3)$ van $PG(2, \mathbb{F}_9)$. Merk eerst op dat

$$GF(9) = \{a + b\varepsilon \mid \varepsilon^2 = -1; a, b \in GF(3)\}$$

wordt gegenereerd door $\omega := 1 - \varepsilon$ (en niet door ε).

$PG(2, \mathbb{F}_9)$ bevat 13 reële en 78 complexe punten. Wij vragen ons af of deze 91 punten kunnen worden gepartitioneerd in 7 disjuncte Baer-subvlakken van de orde 3, zie [18] pp. 67-88, i.h.b. p. 78.

Beschouw $PG(2, \mathbb{F}_q)$ met de bijbehorende vectorruimte $V = V(3, \mathbb{F}_q)$. Een niet-singuliere lineaire afbeelding $S: V \rightarrow V$ induceert een collineatie van $PG(2, \mathbb{F}_q)$. Een Singer cycle van $PG(2, \mathbb{F}_q)$ is een rij vectoren

$$\underline{x}, S\underline{x}, S^2\underline{x}, \dots, S^{q^2+q}\underline{x}$$

die alle punten van $PG(2, \mathbb{F}_q)$ voorstelt. Criterium is dat de Singer matrix S geen eigenwaarde in \mathbb{F}_q heeft. Voor $PG(2, \mathbb{F}_3)$ en voor $PG(2, \mathbb{F}_9)$ voldoen

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{en} \quad T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \omega^t \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

De boven gevraagde partitie van $PG(2, \mathbb{F}_9)$ in 7 Baer-subvlakken wordt verkregen door de 13 machten van S tot te passen op de 7 vectoren

$$(1, 0, 0), (\omega, 1, 0), (-\omega, 1, 0), (\omega^2, 1, 0), (-\omega^2, 1, 0) \\ (\omega^3, 1, 0), (-\omega^3, 1, 0).$$

Samen met $(0, 1, 0)$, $(1, 1, 0)$ en $(-1, 1, 0)$ vormen deze vectoren in't vlak $z = 0$ in $V(3, \mathbb{F}_9)$ een $PG(1, \mathbb{F}_9)$.

3.3. Transversal designs, etc.

Zij $S = \{0, 1, \dots, n-1\}$ een verzameling van n symbolen. Een k-vector is een element van $S^k = S \times S \times \dots \times S$. Noem de coördinaatposities de plaatsen.

Een transversal design $T(k, n)$ op S is een verzameling van n^2 stuks k -vectoren zodat voor elk paar plaatsen elk geordend paar symbolen uit S precies één keer voorkomt. De $k \times n^2$ matrix die de k -vectoren als kolommen heeft is orthogonal array $OA(k, n)$ van sterkte 2. Elk tweetal rijen heeft op overeenkomstige plaatsen precies alle geordende paren uit S (is orthogonaal).

Normaliseer de beide eerste rijen tot

$$\begin{array}{cccccccccccc}
 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & \dots & (n-1) & (n-1) & \dots & (n-1) \\
 0 & 1 & 2 & \dots & (n-1) & 0 & 1 & \dots & (n-1) & \dots & 0 & 1 & \dots & (n-1)
 \end{array}$$

Dan leveren de overige $k-2$ rijen, gearrangeerd in $n \times n$ -matrices, een stelsel van $k-2$ orthogonale latijnse vierkanten van de orde n , zeg $(k-2)$ MOLS(n). Anders gezegd, selecteer voor de k -vector twee plaatsen (zeg rij en kolom). Voor een andere plaats m bepaalt elke rij $a \in S$ en kolom $b \in S$ een symbool $A_{a,b}^m \in S$. De matrix $A^m = [A_{a,b}^m]_{a,b \in S}$ is een Latijns vierkant. De

$k-2$ aldus verkregen matrices A^1, \dots, A^{k-2} vormen $(k-2)$ MOLS.

Opgave. Bewijs dit!

Opgave. Bij een gegeven $T(k, n)$ wordt een graaf gedefinieerd als volgt. De knopen zijn de k -vectoren, en twee knopen zijn verbonden als de corresponderende k -vectoren op één plaats overeenstemmen. Deze graaf is sterk regulier. Bewijs dit.

De duale structuur van een transversal design $TD(k,n)$ is een (k,n) -net N , dat als volgt wordt gedefinieerd. De punten van N zijn de k -vectoren van $TD(k,n)$. Een lijn van N is een verzameling van k -vectoren die op één plaats een constant symbool hebben. Een punt ligt op een lijn wanneer de corresponderende k -vector op de corresponderende plaats het corresponderende symbool heeft. Er zijn n^2 punten, elke lijn heeft n punten, door elk punt gaan k lijnen, er zijn nk lijnen. Voorts gelden (als $k > 2$) voor de verzamelingen \mathcal{P} der punten en \mathcal{L} der lijnen de volgende eigenschappen.

N1. Er is ten hoogste één lijn door twee verschillende punten.

N2. $\forall P \in \mathcal{P} : \forall P \notin \ell \in \mathcal{L} : \exists! m \in \mathcal{L} : (P \in m, \ell \cap m = \emptyset)$.

N3. Er zijn 3 punten niet op een lijn, zodat elk tweetal op een lijn ligt.

Omgekeerd, zij $(\mathcal{P}, \mathcal{L})$ een eindige incidentie structuur die voldoet aan N1, N2, N3. Noem $l, m \in \mathcal{L}$ evenwijdig wanneer l en m samenvallen of gerelateerd zijn volgens N2. Evenwijdigheid is een equivalentie relatie (bewijs!), die \mathcal{L} verdeelt in (zeg k) klassen van een constant aantal (zeg n) onderling evenwijdige lijnen. Er zijn n^2 punten, nk lijnen, n punten per lijn, en van elk der k klassen één lijn per punt (bewijs!). Geef de n verschillende lijnen van elke klasse aan door verschillende symbolen uit $\{0, 1, \dots, n-1\}$. Dan wordt elk punt aangegeven door een k -vector. De n^2 punten vormen de k -vectoren van een transversal design. Inderdaad, voor elk paar klassen komt elk geordend paar symbolen precies één keer voor.

Stelling. De volgende objecten zijn equivalent :

$T(k,n)$, $OA(k,n)$, $(k-2)$ MOLS(n) , (k,n) -net .

3.4. Het affiene vlak.

Een affien vlak is een incidentie structuur zodat

AG 1. Elk tweetal verschillende punten ligt op één lijn.

AG 2. Voor elk punt-lijn paar (P, l) met $P \notin l$ is er één lijn door P en disjunct met l (zeg $l // 1$).

AG 3. Er zijn 3 punten die niet op een lijn liggen.

Zij l een lijn van het projectieve vlak \mathcal{P} . Zij \mathcal{P}^l de incidentie structuur die ontstaat door uit \mathcal{P} de lijn l met al zijn punten weg te laten. Dan is \mathcal{P}^l een affien vlak.

Stelling. Bij een affienvlak \mathcal{A} behoort een op isomorfie na eenduidig projectief vlak \mathcal{P} met de eigenschap dat

$$\mathcal{A} = \mathcal{P}^l \text{ voor zekere } l \text{ van } \mathcal{P}.$$

Inderdaad, zij \mathcal{A} een affien vlak. Voeg toe als punten de klassen van de equivalentie relatie $(l=m) \vee (l // m)$.

Voeg toe als lijn de verzameling v der klassen. Met geschikte incidentie ontstaat dan een projectief vlak \mathcal{P} met $\mathcal{P}^v = \mathcal{A}$. De lijn v heet de oneigenlijke lijn voor \mathcal{A} , en de punten van v heten de oneigenlijke punten voor \mathcal{A} .

Stelling. De affiene vlakken \mathcal{P}^l en \mathcal{P}^m zijn isomorf iff $\exists \sigma \in \text{Coll}(\mathcal{P}) : (l^\sigma = m)$.

Als $\text{Coll}(\mathcal{P})$ niet transitief is op de lijnen van \mathcal{P} dan behoren dus bij \mathcal{P} niet-isomorfe affiene vlakken.

Een eindig affien vlak heeft de orde n , wanneer het bijbehorende projectieve vlak de orde n heeft, en wordt genoteerd met $\text{AG}(2, n)$. Het vlak heeft n^2 punten, $n^2 + n$ lijnen, n punten per lijn, $n+1$ lijnen per punt, en $n+1$ parallelklassen van elk n lijnen.

Stelling. De volgende objecten zijn equivalent :

$AG(2,n)$, $T(n+1,n)$, $OA(n+1,n)$, $(n-1)MOLS(n)$.

Wij geven nogmaals het verband tussen $AG(2,n)$ en $T(n+1,n)$. Zij gegeven een transversal design $T(n+1,n)$ op S . Een punt is een $(n+1)$ -vector. Een lijn is een verzameling van $(n+1)$ -vectoren die op één plaats een constant symbool hebben. Dan vormen de punten en lijnen een $AG(2,n)$ (bewijs!).

Omgekeerd, ga uit van het affiene vlak $AG(2,n)$. Noem de punten van l_∞ de plaatsen. Selecteer twee oneigenlijke punten $Y = (x\text{-coördinaat})$ en $X = (y\text{-coördinaat})$. Voorzie de lijnen door Y en de lijnen door X van de verschillende symbolen uit $S = \{0,1,\dots,n-1\}$. Dan heeft elk punt van $AG(2,n)$ twee coördinaatsymbolen. Als B het snijpunt is van de lijn met symbool 0 door Y en de lijn met symbool b door X , dan krijgt elke lijn door B het symbool b (behalve BY die al het symbool 0 heeft). Nu zijn alle lijnen voorzien van symbolen. Voeg aan elk punt P toe de $(n+1)$ -vector waarvan elke plaats wordt gevuld met het symbool van de lijn door P naar die plaats op l_∞ . De aldus gedefiniëerde $(n+1)$ -vectoren vormen een transversal design $T(n+1,n)$ over S (bewijs!).


De n^2 kolommen van de bijbehorende $OA(n+1,n)$ komen overeen met de n^2 punten van $AG(2,n)$, gearrangeerd volgens de n punten van de n lijnen door Y . Zonder de algemeenheid te schaden kunnen wij $OA(n+1,n)$ de volgende vorm geven :

plaatsen	Y	0 0 . . 0	1 1 . . 1	.	a a . a . a	.	n-1 . n-1	
	X	0 1 . . n-1	0 1 . . n-1	.	0 1 . b . n-1	.	0 . n-1	
	1	0 1 . . n-1	1	.	a	.	n-1	

	m	0 1 . . n-1	m	.	$A_{a,0}^m$ $A_{a,b}^m$.	.	.

n-1	0 1 . . n-1	n-1	

De lijn door Y met symbool a en de lijn door X met symbool b bepalen een punt met de coördinaten (a,b) , waarvan de verbindingslijn naar de plaats m het symbool $A_{a,b}^m$ krijgt.



De lijnen door de punten van $x=a$ naar de plaats m snijden de Y -as volgens de ordinaten $A_{a,y}^m$. Deze symbolen vormen de a^e rij van $A^m = [A_{a,b}^m]_{a,b \in S}$. De matrices A^1, \dots, A^{n-1} vormen een $(n-1)$ MOLS(n).


De m^e rij van het OA($n+1, n$) is de concatenatie van de rijen van A^m .

Opmerking. $A_{a,b}^m$ definieert een ternaire relatie A op S , zie [11].


Een affien vlak $AG(2, n)$ heet lineair wanneer, voor alle $m=1, 2, \dots, n-1$, de matrices A^m dezelfde verzameling van rijen hebben.

Stelling. $AG(2, n)$ is lineair iff de prisma eigenschap van Desargues geldt t.o.v. $(Y, 1_\infty)$.

Bewijs. Beschouw de Latijnse vierkanten A^m en A^n . Wij willen aantonen dat er bij elke rij a van A^m een rij a' van A^n bestaat, die overeenstemt op de kolommen b en b' .



Een blik op de onderstaande figuur geeft het verband met de prisma eigenschap.




Voorbeeld. Constructie van $AG(2, \mathbb{F}_4)$ met behulp van 3 MOLS(4). Zowel $AG(2, \mathbb{F}_4)$ als het bijbehorende $PG(2, \mathbb{F}_4)$ zijn uniek.


Y	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
X	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
1	0	1	2	3	1	0	3	2	2	3	0	1	3	2	1	0
2	0	1	2	3	2	3	0	1	3	2	1	0	1	0	3	2
3	0	1	2	3	3	2	1	0	1	0	3	2	2	3	0	1

De rijen 1,2,3 van het OA zijn de concatenaties van de drie orthogonale Latijnse vierkanten van de orde 4. In dit voorbeeld komen de Latijnse vierkanten ook voor als deelmatrices van de OA. Is dit toeval?

Neem aan dat het omgekeerde van de prisma-eigenschap van Desargues geldt t.o.v. (X, l_∞) . Dan vormen de deelmatrices B^1, \dots, B^{n-1} van het OA een stelsel van $(n-1)$ MOLS(n) :



Inderdaad, de matrices B^i zijn latijnse vierkanten (Bewijs!). Voorts zijn B^i en B^j orthogonaal. Immers, stel van niet, dus stel dat de volgende situatie optreedt :




De kolommen 1,2,3,4,5,6 corresponderen met zes punten in het affiene vlak waarvoor geldt

$$12 \parallel 34 \parallel 56, \quad 13 \parallel 25, \quad 14 \parallel 26 \quad \text{en} \quad 35 \parallel 46.$$

Dit is strijdig met de prismaeigenschap, die zegt dat


$$12 \parallel 35 \parallel 46.$$



Stelling. $B_i = [A_{ib}^m]_{m,b \in S}$, $i = 1, \dots, n-1$ vormen $(n-1)$ MOLS(n) iff het omgekeerde van de prisma-eigenschap van Desargues geldt t.o.v. $(X, 1_\infty)$.

3.5. Optellen en vermenigvuldigen van coördinaten.

Voor elk punt van $AG(2, n)$ hebben wij coördinaten (a, b) t.o.v. de oneigenlijke punten Y en X geïntroduceerd, waarbij $a, b \in S = \{0, 1, \dots, n-1\}$. Voor de symbolen uit S definiëren wij de optelling en de vermenigvuldiging als volgt (zie [11], chapter 5).



Voor de aldus gedefinieerde bewerkingen geldt (ga na!)


$$0 + a = a = a + 0, \exists! x \in S (a + x = c), \exists! x \in S (x + b = c),$$

$$1a = a = a1, \exists! x \in S (mx = c), \exists! x \in S (xa = c).$$

Dit maakt zowel $(S, +)$ als (S, \cdot) tot een loop.

Opmerking. Dit maakt S met de ternaire relatie $A_{a,b}^m$ tot een ternaire ring, zie [11] p. 113.

De geldigheid van andere algebraïsche eigenschappen in $(S, +, \cdot)$ hangt samen met de geldigheid van bepaalde meetkundige eigenschappen, en van transitiviteits-eigenschappen van de collineatie groep. Wij geven enige voorbeelden. Voor uitputtende behandeling zie [1] en [3].



Beschouw de lijn door (a,b) en het oneigenlijke punt (m) ; deze lijn snijdt de Y-as in $(0, A_{a,b}^m)$. Zojuist hebben wij het punt $(0,ma)$ gedefinieerd met behulp van de lijn door $(a,0)$ en (m) .

Stelling. Als $AG(2,n)$ lineair is, dan geldt

$$\forall m, a, b \in S : (A_{a,b}^m = ma + b).$$

Bewijs. De lineariteit van $AG(2,n)$ is gelijkwaardig met het gelden van de prisma-eigenschap t.o.v. $(Y, 1_{\infty})$. De verbindingslijnen van de corresponderende hoekpunten van de gearceerde driehoeken zijn evenwijdig aan de Y-as. Eén paar zijden is evenwijdig aan (m) , één paar is evenwijdig aan de X-as. Dan moet ook het derde paar

evenwijdig zijn, en moet de lijn door (ma, b) door (1) gaan. Wegens de definitie van optelling volgt hieruit het gestelde.

$AG(2, n)$ is een translatievlak iff de prisma-eigenschap geldt voor alle oneigenlijke centra. Voor een translatievlak geldt behalve de lineariteit ook dat $(S, +)$ een Abelse groep is, en dat ook voor $(S, +, .)$ de links-distributieve wet geldt:

$$a(b + c) = ab + ac .$$


Dit maakt $(S, +, .)$ tot een quasiveld (= Veblen-Wedderburn system). Als ook de pyramide-eigenschap onbeperkt geldt, dan geldt ook de andere distributieve wet en is $(S, +, .)$ een division-ring (= semi-field).

De volledige geldigheid van de stelling van Desargues maakt ook de vermenigvuldiging associatief, en $(S, +, .)$ is een scheef-lichaam. Eindige scheve lichamen hebben een commutatieve vermenigvuldiging (Stelling van Wedderburn). De volledige geldigheid van Desargues voor $AG(2, n)$ maakt dus $(S, +, .)$ tot een eindig lichaam. Volgens de stelling van Artin-Zorn wordt $(S, +, .)$ reeds tot een eindig lichaam door het bestaan van alle mogelijke elaties voor $AG(2, n)$. Voor bijzonderheden zij verwezen naar [11] .

Tenslotte tonen wij aan dat de commutativiteit van de vermenigvuldiging in $(S, +, .)$ volgt uit de geldigheid van het bijzondere geval van de stelling van Pappus dat op blz 7 werd besproken. Inderdaad, uit

$$PV // QW , \quad QU // RV \quad \text{volgt dat} \quad PU // RW ,$$

dus $(O, ma) = W = (O, am)$ en $am = ma$:



3.6. Niet-Desarguese vlakken.

Er bestaan drie voorbeelden van projectieve vlakken $PG(2, 9)$ waarin de stelling van Desargues niet altijd geldt, zie [18]. Zij zijn gebaseerd op het nearfield van de orde 9. Zij

$$Q = \{0, \pm 1, \pm \alpha, \pm \beta, \pm \gamma : \alpha + \beta + \gamma = 0, \alpha - \beta = \beta - \gamma = \gamma - \alpha = 1\}$$

een vectorruimte van dimensie 2 over $GF(3)$. Definieer vermenigvuldiging zoals bij de quaternionen:

$\alpha^2 = \beta^2 = \gamma^2 = -1$, $\beta\gamma = -\gamma\beta = \alpha$, $\gamma\alpha = -\alpha\gamma = \beta$, $\alpha\beta = -\beta\alpha = \gamma$, zodat $\alpha\beta\gamma = -1$. Dit maakt $(Q, +, \cdot)$ tot een nearfield (alle lichaamseigenschappen gelden, behalve de commutativiteit en de links-distributiviteit, wél de rechts-distributiviteit):

$$(\beta + 1)\beta = \alpha\beta = \alpha(\alpha - 1)$$

$$\beta^2 + \beta = -1 + \beta = \gamma = 1 + \alpha = -\alpha^2 + \alpha$$

Noem $\mathbb{R} := \{0, \pm 1\}$ reëel en $\mathbb{H} = \{\pm \alpha, \pm \beta, \pm \gamma\}$ imaginair. Dit nearfield heeft $\text{Aut} = \text{Sym}(3)$ met 6 elementen tegen 2 voor $GF(9)$.

Opmerking. In termen van een primitief element ω kunnen wij in $Q = \{0, \omega^0, \omega^2, \omega^4, \omega^6, \omega^1, \omega^3, \omega^5, \omega^7\}$

de vermenigvuldiging definiëren door

$$\omega^i \omega^j = \omega^{i+j} \text{ voor } j \text{ even, } \omega^i \omega^j = \omega^{i+3j} \text{ voor } j \text{ on- even.}$$

Met behulp van het nearfield Q definiëren wij een affien vlak door

$$\mathcal{P} = \{(x, y) \mid x, y \in Q\}, \quad |\mathcal{P}| = 81,$$

$$\mathcal{L} = \{y = xm + n \text{ en } x = a \mid m, n, a \in Q\}, \quad |\mathcal{L}| = 90.$$

Er is voldaan aan de axioma's van een affien vlak. In-
derdaad, zij $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_2 = (x_2, y_2)$. Als $x_1 = x_2$, $y_1 \neq y_2$
dan voldoet slechts $x = x_1$. Als $x_1 \neq x_2$ dan moet

$$y_1 = x_1^m + n, \quad y_2 = x_2^m + n, \quad y_1 - y_2 = (x_1 - x_2)^m,$$

$$m = (x_1 - x_2)^{-1} (y_1 - y_2), \quad n = y_2 - x_2^m.$$

Voor $A = (a, b)$, $l = \{(x, y) \mid y = xm + n\}$ voldoet de lijn
 $y = xm + (b - am)$ aan het axioma van Euclides.

De collineaties van het aldus gedefinieerde affiene
vlak zijn

$$(x, y) \mapsto (x + \rho, y + \sigma); \quad (x, y) \mapsto (x\rho, y\sigma) \quad \rho, \sigma \neq 0;$$

$$(x, y) \mapsto (y, x); \quad (x, y) \mapsto (x+y, x-y);$$

$$(x, y) \mapsto (Sx, Sy), \quad S \in \text{Aut } Q, \quad \text{voor } \rho, \sigma \in Q.$$

Het bestaan van de eerste groep van collineaties maakt
het vlak een translatievlak.

Opmerking. De afbeeldingen $(x, y) \mapsto (\rho x, \sigma y)$ behoeven
geen collineaties te zijn. Bij voorbeeld $(x, y) \mapsto (\alpha x, \alpha y)$
beeldt de op $y = x + 1$ liggende punten $(0, 1)$, $(1, -1)$, (α, γ)
af op de niet-collineaire $(0, \alpha)$, $(\alpha, -\alpha)$, $(-1, -\beta)$.

Opgave. Geef een voorbeeld waaruit volgt dat dit projectieve vlak niet-Desargues is.

Ook het duale vlak is een projectief vlak (niet-isomorf) waarin Desargues niet algemeen geldt.

Er is nog een derde vlak waarin Desargues niet geldt; het is zelfduaal; het is een Hughes-vlak, de punten zijn alle (x,y) , $x,y \in Q$. De rechten zijn reëel of imaginair, $12 + 78 = 90$ stuks:

$$\begin{array}{ll} y = ax + b, & y - b = p(x - a) \quad , \\ x = c \quad ; & y = ax + q, x = r \quad ; \\ a, b, c \in \mathbb{R}. & p, q, r \in \mathbb{H} . \end{array}$$

Dit Hughes-vlak is geen translatievlak, zie [18] .


Opmerking. Bij deze 4 projectieve vlakken behoren $7 = 1 + 2 + 2 + 2$ affiene vlakken van de orde 9 . Zie R. Kamber, Untersuchungen über affine Ebenen der Ordnung 9, Thesis ETH Zürich, 1976, CFH 76 .

3.7. Eindige affiene translatievlakken.

Een translatie van $AG(2,n)$ is een elatie met l_∞ als as. $AG(2,n)$ bezit ten hoogste n^2 translaties. Inderdaad, l_∞ bevat $n+1$ mogelijke centra voor translaties; voor elk centrum bestaan (afgezien van de identiteit) ten hoogste $n-1$ translaties. Wij gebruiken de additieve schrijfwijze voor de groepen $\Gamma_{C_i} := \Gamma_{C_i, l_\infty}$ der translaties met centrum C_i en as l_∞ . Wij nemen aan dat er tenminste twee centra $C_1, C_2 \in l_\infty$ zijn waarvoor $\Gamma_{C_i} \neq \{0\}$.

Stelling. $T := \bigcup_{C \in l_\infty} \Gamma_C$ is een elementair Abelse groep

(een directe sam van cyclische groepen \mathbb{Z}_p , voor een zelfde priemgetal p).



Bewijs. Voor $\gamma \in \Gamma_C$, $\delta \in \Gamma_D$ geldt $\gamma + \delta \in \Gamma_E$, dus T is een groep. Voor $C \neq D$ vormen $P, P^\gamma, P^\delta, P^{\gamma+\delta}$ een parallelogram, dus $\gamma + \delta = \delta + \gamma$. Ook voor $\gamma, \gamma' \in \Gamma_C$ volgt de commutativiteit. Er bestaat een $\gamma \in \Gamma_C$ van priem orde, zeg $p \neq 1$. Dan heeft ook $0 \neq \delta \in \Gamma_D$ de orde p . Inderdaad,

$p\delta \in \Gamma_D$, $\gamma \neq 0 = p\gamma$. $p\delta = p(\delta + \gamma) \in \Gamma_E$,
 en $\Gamma_D \cap \Gamma_E = \{0\}$. Alle elementen $\neq 0$ hebben dus de orde p en T is elementair Abels.

Gevolg. $|\Gamma_C|$ is deelbaar op n , voor elke $C \in l_\infty$;
 $|T|$ is deelbaar op n^2 .

Voor de rest van deze paragraaf nemen wij aan dat $AG(2, n)$ een translatievlak is. Dan geldt

$$|T| = n^2, \text{ en } |\Gamma_C| = n \text{ voor elke } C \in l_\infty.$$

Als gevolg van de stelling is de translatie groep T commutatief en $n = p^k$, p priem.

Zij $(\Phi, +, \cdot)$ de ring der endomorfismen van T , dat

is $\Phi := \{ \varphi : T \rightarrow T \mid \forall \alpha, \beta \in T : ((\alpha + \beta)^\varphi = \alpha^\varphi + \beta^\varphi) \}$,

waarin $\varphi + \psi$, $\varphi \cdot \psi$ worden gedefinieerd door

$$\forall \alpha \in T : (\alpha^{\varphi + \psi} := (\alpha^\varphi)^\psi, \alpha^{\varphi \cdot \psi} := \alpha^\varphi + \alpha^\psi).$$

De kern K van $T = \bigcup_{C \in I_\infty} \Gamma_C$ is de verzameling der

endomorfismen $\varphi : T \rightarrow T$ waarvoor

$$(\Gamma_C)^\varphi \subseteq \Gamma_C, \quad \text{voor elke } C \in I_\infty.$$

Stelling. $(K, +, \cdot)$ is een lichaam.

Bewijs. De endomorfismen identiteit en $0 : T \rightarrow \{0\}$

behoren tot K . Zij $\varphi, \psi \in K$ dan $\varphi\psi \in K$ en

$\varphi \pm \psi \in K$ wegens

$$(\Gamma_C)^{\varphi\psi} \subseteq \Gamma_C^\varphi \subseteq \Gamma_C, \quad \gamma^{\varphi \pm \psi} = \gamma^\varphi + \gamma^\psi \in \Gamma_C^\varphi + \Gamma_C^\psi \subseteq \Gamma_C + \Gamma_C = \Gamma_C$$

voor $\gamma \in \Gamma_C$. Blijft nog aan te tonen dat elke $\varphi \in K^*$ één-éénduidig op is. Inderdaad, zij $\gamma^\varphi = \delta^\varphi$ met $\gamma \neq \delta \in T$ dus $\gamma - \delta =: \alpha \neq 0 = \alpha^\varphi$. Zij $\alpha \in \Gamma_A$, kies $\beta \in \Gamma_B \in T \setminus \Gamma_A$, dan $\alpha + \beta \notin \Gamma_A \cup \Gamma_B$ maar (zeg) $\alpha + \beta \in \Gamma_C$, $A \neq C \neq B$.

Nu geven $\beta^\varphi = \alpha^\varphi + \beta^\varphi = (\alpha + \beta)^\varphi \in \Gamma_C$ en $\Gamma_B \cap \Gamma_C = \{0\}$

dat $\beta^\varphi = 0$. Maar dan is $\tau^\varphi = 0$ voor elke $\tau \in T$,

dus $\varphi = 0$, een tegenspraak. Dit bewijst dat $\varphi \in K^*$

één-éénduidig is. Bewijs zelf dat φ een afbeelding op is.

Een vectorruimte over een lichaam K is een Abelse groep

T en een afbeelding $K \times T \rightarrow T$ zodat voor alle

$\varphi, \psi \in K$; $\alpha, \beta \in T$, geldt

$$\varphi(\alpha + \beta) = \varphi\alpha + \varphi\beta, (\varphi + \psi)\alpha = \varphi\alpha + \psi\alpha, (\varphi\psi)\alpha = \varphi(\psi\alpha), 1\alpha = \alpha.$$

Stelling. De groep T der translaties van een translatievlak is een vectorruimte over de kern K . De ondergroepen Γ_C , $C \in l_\infty$, zijn lineaire deelruimten. In de corresponderende projectieve ruimte vormen de corresponderende deelruimten een spread.

Voorbeeld. Zij gegeven een spread van lijnen in $PG(3, q)$. Beschouw $PG(4, q) = AG(4, q) \cup PG(3, q)$. Noem "punten" de q^4 punten van $AG(4, q)$. Noem "lijnen" de vlakken in $PG(4, q)$ die $PG(3, q)$ snijden in een lijn van de spread. De "punten" en de "lijnen" vormen een affien translatievlak van de orde q^2 . Inderdaad, er is voldaan aan de axioma's (ga na!).

Opgave. Zij gegeven een spread van deelruimten $PG(r-1, q)$ in $PG(2r-1, q)$. Beschouw

$$PG(2r, q) = AG(2r, q) \cup PG(2r-1, q).$$

Definieer een $AG(2, q^r)$.

Opgave. Een translatievlak is Desargues iff de translatiegroep T en de kern K voldoen aan $[T : K] = 2$.

Stelling (André 1954). Er is een 1-1 correspondentie tussen de translatievlakken van de orde q^{t+1} met kern \mathbb{F}_q , en de t -spreads in $PG(2t+1, q)$.

Voor verdere theorie en constructie zij verwezen naar [17], [15] § 11, en [4] chapter V.

4. Polaire meetkunde .

4.1. Polariteiten .

Zij \mathcal{P} een projectieve meetkunde, dat is, de verzameling van alle deelruimten van een projectieve ruimte. Een correlatie δ van \mathcal{P} is een permutatie van \mathcal{P} die de inclusie inverteert :

$$\forall S, T \in \mathcal{P} : ((S \subset T) \implies (S^\delta \supset T^\delta)) .$$

Een polariteit π is een correlatie van de orde 2, dus $\pi^2 = \text{id}$. Dan geldt ook

$$\forall S, T \in \mathcal{P} : ((S \subset T^\pi) \implies (T \subset S^\pi)) .$$

Een voorbeeld van een polariteit in een projectief vlak is de klassieke verwantschap pool \longleftrightarrow poollijnen opzichte van een kegelsnede.

Voor een correlatie δ heet $S \in \mathcal{P}$ totaal isotroop als $S \cap S^\delta = S$, isotroop als $S \cap S^\delta \neq \emptyset$, niet-isotroop als $S \cap S^\delta = \emptyset$.

Stelling. Een polariteit van een eindig projectief vlak heeft tenminste één isotroop punt.

Bewijs (Ryser). Zij π een polariteit van $\text{PG}(2, n)$; nummer de punten en de lijnen van $\text{PG}(2, n)$ zó dat $l_i = P_i^\pi$ voor $i = 1, \dots, n^2 + n + 1$. Dan is de punt-lijn incidentie matrix N symmetrisch, en

$$N^2 = NN^t = nI + J .$$

Daarom heeft N de eigenwaarden $(n+1)^1$, $(\sqrt{n})^a$, $(-\sqrt{n})^b$. Stel

$$\text{Spoor } N = n+1 + (a-b)\sqrt{n} = 0,$$

dan zou \sqrt{n} geheel en deelbaar op $n+1$ zijn. Dit is onmogelijk voor $n > 1$. Dus $\text{Spoor } N \neq 0$, $\text{diag } N$ bevat tenminste één 1, er is tenminste één punt $P \in P^n$. \square

Zij $\mathcal{P}(V)$ de projectieve meetkunde die behoort bij een vectorruimte V over een lichaam \mathbb{F} . Een voorbeeld van een correlatie van $\mathcal{P}(V)$ wordt gegeven door

$$\mathcal{S} : S \mapsto S^{\mathcal{S}} := \{x \mid f(x, S) = 0\}, \quad S \in \mathcal{P},$$

waarin $f : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ een niet-ontaarde bilineaire vorm op V is (zie [9] hoofdstuk 3, "Pairings and bilinear forms"). De afbeelding \mathcal{S} is eveneens een correlatie wanneer f een niet-ontaarde sesquilineaire vorm is (zie [9] hoofdstuk 5, "The unitary group"). Omgekeerd is elke correlatie van $\mathcal{P}(V)$ afkomstig van een niet-ontaarde sesquilineaire vorm op V .

Zij $\sigma \in \text{Aut } \mathbb{F}$. Een sesquilineaire vorm $f : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ wordt gedefinieerd door

$$\begin{aligned} f(x+x', y+y') &= f(x, y) + f(x, y') + f(x', y) + f(x', y'), \\ f(\alpha x, \beta y) &= \alpha \bar{\beta} f(x, y), \end{aligned}$$

voor alle $x, x', y, y' \in V$; $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$. Wanneer σ de identiteit is, dan is f een bilineaire vorm. Een sesquilineaire vorm is niet-ontaard wanneer

$$(\forall y \in V : (f(x, y) = 0)) \implies (x = 0), \quad \text{m.a.w. wanneer } V^{\mathcal{S}} = \{0\}.$$

Een sesquilineaire vorm f heet reflexief wanneer

$$\forall x, y \in V : ((f(x, y) = 0) \implies (f(y, x) = 0)).$$

De polariteiten van $\mathcal{P}(V)$ zijn precies de polariteiten die afkomstig zijn van de reflexieve niet-ontaarde sesquilineaire vormen op V . Deze zijn de volgende (voor het bewijs zie [9], 3.13 en 5.2, of [5], 5.3 en 5.8.).

I. (alternierend) : $- = \text{id}, \forall x \in V : (f(x, x) = 0),$

II. (symmetrisch) : $- = \text{id}, \forall x, y \in V : (f(x, y) = f(y, x)),$
 $\exists z \in V : (f(z, z) \neq 0),$

III. (Hermiets) : $- \neq \text{id}, \forall x, y \in V : (f(x, y) = \overline{f(y, x)}).$

In het geval I volgt dat

$$\forall x, y \in V : (f(x, y) + f(y, x) = 0),$$

dus dat de vorm scheef is voor $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, en symmetrisch voor $\text{char } \mathbb{F} = 2$.

De polariteiten van $\mathcal{P}(V)$, die behoren bij de gevallen I, II, III, worden genoemd symplectische, orthogonale en unitaire polariteiten, respectievelijk. Een symplectische, orthogonale, unitaire projectieve meetkunde is een $\mathcal{P}(V)$, waarbij V is voorzien van een symplectische, orthogonale of unitaire polariteit.

4.2. Symplectische Meetcunde.

Een symplectische ruimte (V, f) is een vectorruimte $V(d, \mathbb{F})$ voorzien van een niet-ontaarde alternerende bilineaire vorm f . Noteer $f = (\quad , \quad)$. Kies $c_1 \in V$, kies $c_2 \in V$ zodat $(c_1, c_2) = 1$. Kies $c_3 \in V$ zodat $c_3 \perp \langle c_1, c_2 \rangle$, en herhaal dit proces. In termen van de tweedimensionale deelruimten $V_i = \langle c_{2i-1}, c_{2i} \rangle$ (de hyperbolische vlakken) schrijven wij

$$V = V_1 \perp V_2 \perp \dots \perp V_{\frac{1}{2}d}.$$

Na verandering van volgorde heeft de basis (de symplectische basis) de matrix (de Gram matrix)

$$[(c_i, c_j)] = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{bmatrix}$$

Blijkbaar is d even, en heeft V totaal isotrope deelruimten van dimensie $\frac{1}{2}d$.

Opmerking. Wanneer (\quad , \quad) ontaard is dan is er een niet triviale radicaal

$$\text{Rad } V := \{ y \in V \mid \forall x \in V: ((x, y) = 0) \},$$

$$V = \text{Rad } V \perp V_1 \perp \dots \perp V_m = U_1 \perp \dots \perp U_r \perp V_1 \perp \dots \perp V_m,$$

waarin $U_i = \langle a_i \rangle$, $V_i = \langle c_{2i-1}, c_{2i} \rangle$, a_i isotroop, c_{2i-1} en c_{2i} een hyperbolisch paar als boven.

Opmerking. Al is een vorm f niet-ontaard op V , zijn restrictie tot een deelruimte U van V kan best ontaard zijn.

Een isometrie van (V, f) in (V', f') is een lineaire afbeelding $\varrho : V \rightarrow V'$ zodat

$$\forall x, y \in V : (f'(\varrho x, \varrho y) = f(x, y)).$$

Stelling van Witt. Zij $\varrho : V \rightarrow V'$ een isometrie op van twee symplectische ruimten (V, f) en (V', f') . Zij $\sigma : U \rightarrow V'$ een isometrie van een deelruimte $U < V$ in V' . Dan kan σ worden uitgebreid tot een isometrie $\tilde{\sigma} : V \rightarrow V'$.

Voor het bewijs zie [9], 3.28, 3.30, 3.31, 3.32. Een gevolg van de stelling van Witt is dat alle maximale totaal isotrope deelruimten van V dezelfde dimensie hebben. Deze dimensie heet de index van V .

De symplectische groep $Sp(V)$ is de groep van alle isometrien van V op zichzelf. In termen van matrices bestaat $Sp(V)$ uit alle A met

$$A \begin{bmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{bmatrix} A^t = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{bmatrix}.$$

Dan $\det A = +1$, in feite $\det A = 1$ (zie [9], 4.4).

De orde van $Sp(d, \mathbb{F}_q)$ kan worden bepaald door het aantal geordende symplectische bases te tellen. Voor c_1 zijn q^{d-1} mogelijkheden. Als $(c_1, c_2) = 1 = (c_1, c_2')$ dan $(c_1, c_2 - c_2') = 0$, dus voor c_2 zijn q^{d-1} mogelijkheden. Daarom geldt

$$\begin{aligned} |Sp(d, \mathbb{F}_q)| &= q^{d-1}(q^d-1)q^{d-3}(q^{d-2}-1) \dots q(q^2-1) = \\ &= q^{\binom{1}{2}d} \prod_{i=1}^{\frac{1}{2}d} (q^{2i}-1). \end{aligned}$$

Voor de structuur van $Sp(d, \mathbb{F}_q)$ zie [9] hoofdstuk 4, "The symplectic group".

Op de bij $V(d, \mathbb{F})$ behorende projectieve ruimte $PG(d-1, \mathbb{F})$ induceert de symplectische vorm $(\ , \)$ een zogenaamde nulpolariteit. Elk projectief punt ligt in zijn poolhypervlak. Elke projectieve rechte heeft een pooldeelruimte van dimensie $d-3$ (de doorsnede van de poolhypervlakken van twee van zijn punten); de projectieve rechte ligt in zijn pooldeelruimte wanneer het corresponderende vlak in $V(d, \mathbb{F})$ totaal isotroop is.

In $PG(3, \mathbb{F})$ is de standaard vorm

$$(x, y) = x_1 y_2 - x_2 y_1 + x_3 y_4 - x_4 y_3.$$

Elk projectief punt $\langle p \rangle$ ligt in zijn poolvlak

$$\langle p \rangle^\perp = \{ \langle x \rangle \in PG(3, \mathbb{F}) \mid (x, p) = 0 \}.$$

In $PG(3, \mathbb{F})$ zijn de maximale totaal isotrope deelruimten projectieve rechten, namelijk de projectieve rechten door $\langle p \rangle$ in het projectieve vlak $\langle p \rangle^\perp$, voor elke $\langle p \rangle \in PG(3, \mathbb{F})$; in $PG(3, q)$ zijn er $q^3 + q^2 + q + 1$ totaal isotrope rechten. Men spreekt van een lineair complex van rechten. $PG(2m-1, q)$ bevat totaal isotrope deelruimten van dimensie $m-1$.

De projectieve symplectische groep $PSp(V)$ is de actie van $Sp(V)$ op de projectieve ruimte $\mathcal{P}(V)$. Op de verzameling \mathcal{P} der punten van $\mathcal{P}(V)$ werkt $PSp(V)$ transitief. Inderdaad, de standaardvorm

$$\begin{bmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{bmatrix} \text{ voor de symplectische vorm kan worden bereikt}$$

uitgaande van een willekeurige vector c . Voorts werkt

$\text{PSp}(V)$ transitief op de paren projectieve punten $\langle c \rangle$, $\langle d \rangle$ met $(c,d) = 0$, en ook op de paren met $(c,d) \neq 0$. Inderdaad, in beide gevallen kan de standaardvorm bereikt worden uitgaande van $\langle c \rangle$ en $\langle d \rangle$.

Op $\mathcal{P} \times \mathcal{P}$ heeft $\text{PSp}(V)$ dus drie banen:

$$\mathcal{P} \times \mathcal{P} = \text{Diag} \cup \{(P,Q) \in \mathcal{P}^2 \mid P \perp Q\} \cup \{(P,Q) \mid P \not\perp Q\}.$$

De niet-triviale relaties definiëren een paar van complementaire grafen, genaamd rang 3 grafen. Deze grafen zijn sterk regulier.

Opgave. Definieer de graaf Γ als volgt. De punten van Γ zijn de projectieve punten van $\text{PG}(2m-1, q)$. Twee punten $\langle p \rangle$ en $\langle q \rangle$ zijn verbonden wanneer zij symplectisch polair zijn, dus als $(p,q) = 0$. Bewijs dat Γ sterk regulier is en bepaal de parameters.

4.3. Orthogonale meetkunde, char $\mathbb{F} \neq 2$.

Een kwadratische vorm op $V(d, \mathbb{F})$ is een afbeelding $Q: V \rightarrow \mathbb{F}$ zodat

$$Q1: \quad Q(\alpha x) = \alpha^2 Q(x), \quad \alpha \in \mathbb{F}, \quad x \in V;$$

$$Q2: \quad Q(x+y) - Q(x) - Q(y) \text{ is een bilineaire vorm op } V.$$

Noem de bilineaire vorm (x,y) dan geldt

$$(x,y) = (y,x), \quad (x,x) = 2Q(x), \quad x, y \in V.$$

Neem aan dat $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, dan kunnen de kwadratische en de symmetrische bilineaire vorm uit elkaar worden afgeleid. Wij hebben dan een orthogonale meetkunde.

Opmerking. Voor $\text{char } \mathbb{F} = 2$ is de bilineaire vorm alternerend, en behoort bij elke bilineaire vorm een

semi-lineaire familie van kwadratische vormen;
 wij komen hierop terug in 4.5.

Zij (V, Q) een vectorruimte voorzien van een kwadratische vorm die niet ontaard is (i.e. waarvan de bilineaire vorm niet ontaard is). Wij leiden twee standaardgedaanten af voor Q .

Kies $c_1 \in V$, $Q(c_1) \neq 0$. Dan is $\langle c_1 \rangle^\perp$ niet ontaard, dus bevat een vector c_2 met $Q(c_2) \neq 0$. Herhaal dit proces, en vind een orthogonale basis van niet-isotrope vectoren. Ten opzichte van deze basis geldt

$$Q(x) = \sum_{i=1}^d \lambda_i x_i^2, \quad (x, y) = 2 \sum_{i=1}^d \lambda_i x_i y_i, \quad \lambda_i = Q(c_i).$$

In termen van symmetrische matrices komt dit neer op diagonaliseren. Het hangt af van \mathbb{F} hoe $Q(x)$ verder te reduceren. Over \mathbb{R} kan de volgende vorm worden bereikt, waarin $2p - d$ de signatuur van Q heet:

$$Q(x) = \sum_{i=1}^p x_i^2 - \sum_{i=p+1}^d x_i^2.$$

Over \mathbb{C} kan een som van d kwadraten worden bereikt.

Hoewel V niet-ontaard is, kunnen totaal isotrope deelruimten U voorkomen. Een vector c , en dus ook $\langle c \rangle$, is ofwel totaal isotroop ofwel niet-isotroop. Voor een 2-dimensionale deelruimte U zijn de mogelijkheden: niet-isotroop, totaal isotroop, isotroop en ontaard, isotroop en niet-ontaard. In het laatste geval, noem hyperbolisch, kan een basis worden gevonden met

matrix $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Inderdaad, zij $U = \langle c, a \rangle$. Neem c isotroop, dan $\langle c, a \rangle \neq 0$. Kies $d = \lambda a + \mu c$ zodat

$$\lambda = 1/(c,a) \quad , \quad \mu = -(a,a)/2(a,c)^2 \quad ,$$

dan voldoen c en d .

Zij (V, Q) een niet-ontaarde orthogonale ruimte. Kies een isotrope vector en vorm een hyperbolisch vlak H_1 . Kies een isotrope vector loodrecht op H_1 en vorm een hyperbolisch vlak H_2 loodrecht op H_1 . Pas dit proces toe totdat er geen isotrope punten meer zijn. De corresponderende basis heeft de Gram matrix

$$\begin{bmatrix} 0 & I & 0 \\ I & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G \end{bmatrix} .$$

Wanneer r de dimensie is van een maximale totaal isotrope deelruimte, dan geldt

$$V = H_1 \perp H_2 \perp \dots \perp H_r \perp W ,$$

waarin H_i hyperbolische vlakken zijn en W een niet-isotrope deelruimte is. (zie [9], 3.30 en 3.34).

Ook voor orthogonale ruimten geldt de stelling van Witt ([9], 3.32) en zijn de dimensies van de maximale totaal isotrope deelruimten dezelfde.

Wanneer $\mathbb{F} = GF(q)$, q oneven, dan kunnen wij méér zeggen. Zij γ een niet-kwadraat in \mathbb{F} . Een niet-ontaard vlak U in V is ofwel niet-isotroop (zet $\varepsilon = -$), ofwel hyperbolisch (zet $\varepsilon = +$). In beide gevallen is het aantal niet-isotrope vectoren $(q - \varepsilon)(q - 1)$. De Gram matrices van geschikte bases van U zijn

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\gamma \end{bmatrix} \quad , \quad \text{resp.} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} ,$$

corresponderend met de kwadratische vormen

$$Q(x) = x_1^2 - \gamma x_2^2, \quad \text{resp.} \quad Q(x) = x_1^2 - x_2^2.$$

Nu weten wij, wegens stelling in 4.1, dat elke V van dimensie > 2 een isotrope vector $\neq 0$ bevat. Als gevolg hiervan bestaan slechts de volgende gevallen voor niet-ontaarde orthogonale meetkunden $(V(d, \mathbb{F}_q), Q)$:

d oneven: $V = H_1 \perp \dots \perp H_{\frac{1}{2}(d-1)} \perp \langle a \rangle$, $Q(a) = 1$ of γ ,

d even, $\varepsilon = +$: $V = H_1 \perp \dots \perp H_{\frac{1}{2}d}$,

d even, $\varepsilon = -$: $V = H_1 \perp \dots \perp H_{\frac{1}{2}(d-2)} \perp W$,

waarin W een niet-isotroop vlak is.

De kwadratische vormen kunnen dus in de volgende standaardvorm worden gebracht:

d oneven: $Q(x) = 2(x_1x_2 + \dots + x_{d-2}x_{d-1}) + x_d^2$ (1 of γ)

d even, $\varepsilon = +$: $Q(x) = 2(x_1x_2 + \dots + x_{d-1}x_d)$,

d even, $\varepsilon = -$: $Q(x) = 2(x_1x_2 + \dots + x_{d-3}x_{d-2}) + x_{d-1}^2 - \gamma x_d^2$.

De index van V , dat is de maximale dimensie van totaal isotrope deelruimten van V , is respectievelijk

$$\frac{1}{2}(d-1), \quad \frac{1}{2}d, \quad \frac{1}{2}(d-2).$$

Zij $\varphi(d)$ het aantal isotrope vectoren $\neq 0$ in $(V(d), Q)$.

Stelling. $\varphi(d) = (q^{\frac{1}{2}d} - \varepsilon)(q^{\frac{1}{2}d-1} + \varepsilon)$ voor d even,

$$\varphi(d) = q^{d-1} - 1 \quad \text{voor } d \text{ oneven.}$$

Bewijs. Elk der bovenstaande gevallen is van de vorm

$$V(d) = H_1 \perp V(d-2) = \langle a, b \rangle \perp V(d-2),$$

met hyperbolische $\langle a, b \rangle$ en $V(d-2)$ van hetzelfde type als $V(d)$. De gevraagde $\varphi(d)$ is het aantal vectoren

$\alpha a + \beta b + v \neq 0$ zodat

$$\alpha, \beta \in \mathbb{F}, v \in V(d-2), 0 = Q(\alpha a + \beta b + v) = \alpha \beta + Q(v).$$

Als $\beta = 0, v = 0$, dan is er één zo'n vector voor elke $\alpha \neq 0$. Als $\beta = 0, v \neq 0$, dan zijn er $\varphi(d-2)$ zulke vectoren voor elke α . Voor elke $\beta \neq 0$ zijn er q^{d-2} zulke vectoren, omdat voor elke $v \in V(d-2)$ een unieke α bestaat zodat $\alpha \beta + Q(v) = 0$. Dus

$$\varphi(d) = q - 1 + q \varphi(d-2) + (q - 1)q^{d-2},$$

$$\varphi(d) - q^{d-1} + 1 = q(\varphi(d-2) - q^{d-3} + 1).$$

De beginwaarden $\varphi(1) = 0$ en $\varphi(2) = (q-1)(1+\varepsilon)$ leiden tot het gestelde.

Een niet-ontaarde kwadriek in $PG(d-1, q)$ wordt gedefinieerd door

$$\{ \langle x \rangle \in \mathcal{P} \mid Q(x) = 0 \}.$$

Als de dimensie van $PG(d-1, q)$ even is, dan is er één type kwadriek; deze bevat maximale projectieve deelruimten van dimensie $\frac{1}{2}(d-3)$. Als de dimensie van $PG(d-1, q)$ oneven is, dan zijn er twee typen kwadrieken: de hyperbolische kwadrieken, van index $\frac{1}{2}d$, die maximale projectieve deelruimten van dimensie $\frac{1}{2}(d-2)$ bevatten, en de elliptische kwadrieken, van index $\frac{1}{2}(d-2)$, die maximale projectieve deelruimten van dimensie $\frac{1}{2}(d-4)$ bevatten.

Voorbeeld. $PG(3, q)$ heeft hyperboloïden met rechten en ellipsoiden zonder rechten. $PG(5, q)$ heeft hyperbolische kwadrieken met vlakken, en elliptische kwadrieken met slechts rechten. $PG(4, q)$ en de Desarguese $PG(2, q)$ hebben één type kwadriek, met resp. zonder projectieve rechten.

Als gevolg van de bovenstaande stelling hebben kwadrieken in $PG(d-1, q)$ de volgende aantallen punten:

d-1	hyp., $\varepsilon = +$	ell., $\varepsilon = -$	kwadr.
2			$q + 1$
3	$(q + 1)^2$	$q^2 + 1$	
4			$q^3 + q^2 + q + 1$
5	$(q^2 + 1)(q^2 + q + 1)$	$(q^3 + 1)(q + 1)$	
even			$(q^{d-1}) / (q-1)$
oneven	$\frac{(q^{\frac{1}{2}d} - \varepsilon)(q^{\frac{1}{2}d-1} + \varepsilon)}{q-1}$		

Beschouw in $PG(d-1, q)$ een kwadriek Q , een punt $\langle a \rangle$ en zijn poolvlak ten opzichte van Q :

$$\langle a \rangle^\perp = \{ \langle x \rangle \mid (x, a) = 0 \}.$$

Wanneer $\langle a \rangle \notin Q$, dan is zijn poolvlak een $PG(d-2, q)$ die Q snijdt in een niet-ontaarde kwadriek van een dimensie lager. Het hangt af van de pariteit van d welke gevallen zich voordoen.


Het poolvlak van $\langle a \rangle \in Q$ heet het raakvlak in $\langle a \rangle$ aan Q . Wij geven een projectieve interpretatie van de formule

$$\frac{\varphi(d)}{q-1} = 1 + q^{d-2} + q \frac{\varphi(d-2)}{q-1}.$$

Het linkerlid is het aantal punten van Q . De 1 slaat op $\langle a \rangle \in Q$. De kwadriek Q bevat q^{d-2} punten die niet in het raakvlak liggen. Dat kan men ook als volgt inzien. In $V(d, q)$ vormen de vlakken door a (resp. in $PG(d-1, q)$ vormen de lijnen door $\langle a \rangle$) een

$$PG(d-2, q) = PG(d-3, q) \cup AG(d-2, q),$$

en q^{d-2} is het aantal punten van $AG(d-2, q)$.



Het raakvlak in $\langle a \rangle \in Q$ snijdt de kwadriek Q in een kegel met top $\langle a \rangle$. Voor elke α hebben wij in $V(d-2)$ een kegel van isotrope vectoren, wegens

$$Q(\alpha a + v) = Q(v) \quad , \quad v \in V(d-2) .$$

De restrictie van de kwadratische vorm $Q(x)$ tot $V(d-2)$ geeft in de bijbehorende $PG(d-3)$ een kwadriek die $\varphi(d-2)/(q-1)$ punten bevat.

De orthogonale groep $\mathcal{O}(V)$ is de groep der isometrieën van (V, Q) op zichzelf, dat is,

$$\mathcal{O}(V) = \left\{ \sigma \in GL(V) \mid \forall x \in V : (Q(x^\sigma) = Q(x)) \right\} .$$

In termen van matrices bestaat $\mathcal{O}(V)$ uit alle A met

$$A E A^t = E ,$$

waarin E de matrix van de bij Q behorende bilineaire vorm is.

De projectieve orthogonale groep $P\mathcal{O}(V)$ is de actie van $\mathcal{O}(V)$ op de projectieve ruimte $\mathcal{P}(V)$. Op de punten van de bij de kwadratische vorm Q behorende kwadriek Ω werkt $P\mathcal{O}(V)$ transitief. Inderdaad, de standaardvorm

$$\begin{bmatrix} 0 & I & 0 \\ I & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G \end{bmatrix}$$

voor de bilineaire vorm kan worden bereikt uitgaande van een willekeurige isotrope vector c . Voorts werkt $P\mathcal{O}(V)$ transitief op de paren isotrope projectieve punten $\langle c \rangle$, $\langle d \rangle$ met $(c, d) = 0$, en ook op de paren met $(c, d) \neq 0$. Daarom werkt $P\mathcal{O}(V)$ op Ω als een rang 3 groep; $P\mathcal{O}(V)$ definieert op de punten van Ω een paar van complementaire rang 3 grafen. Deze grafen zijn sterk regulier.

Voor deze en verdere bijzonderheden betreffende de structuur en de orde van $\mathcal{O}(V)$ en $P\mathcal{O}(V)$ verwijzen wij naar [1] ch.5, [4] 1.4, en [9] chapter 6: "Orthogonal groups, char $\mathbb{F} \neq 2$ ".

Opgave. De graaf Γ wordt als volgt gedefinieerd. De punten van Γ zijn de punten van een kwadriek Ω in $PG(d-1, q)$. Twee punten $\langle p \rangle$ en $\langle q \rangle$ zijn verbonden wanneer hun verbindingslijn op de kwadriek ligt. Bewijs dat Γ sterk regulier is, en bepaal de parameters (er zijn 3 gevallen!).

4.4. Unitaire meetkunde.

Eerst enige opmerkingen over het "complexe" vlak $GF(q^2)$.

Zij ξ een primitief element, dan

$$GF(q^2) = \{0, \xi, \xi^2, \dots, \xi^{q^2-1} = 1\}.$$

De conjugatie $\bar{}$, gedefinieerd door


$$\forall z \in GF(q^2) : (\bar{z} := z^q)$$

is een van de identiteit verschillend automorfisme van $GF(q^2)$ (ga na!). De zelfgeconjugeerde elementen $z = \bar{z}$ zijn

$$\{0, \xi^{q+1}, \xi^{2(q+1)}, \dots, \xi^{(q-1)(q+1)}\};$$

deze elementen vormen een deellichaam $GF(q)$. Definieer twee functies $T = \text{trace}$ en $N = \text{norm}$ door

$$T(z) := z + \bar{z}, \quad N(z) := z\bar{z}.$$



De trace is een $(q, 1)$ afbeelding van $GF(q^2)$ op $GF(q)$. De norm is een $(q+1, 1)$ afbeelding van $GF(q^2) \setminus \{0\}$ op $GF(q) \setminus \{0\}$ (ga na!). Een gevolg hiervan is dat bij elke $r \in GF(q) \setminus \{0\}$ er $q+1$ elementen $z \in GF(q^2)$ bestaan zodat $z\bar{z} = r$. Als $T(z) = 0$ voor $z \in GF(q^2) \setminus \{0\}$, dan is

$$z^{q-1} = -1, \quad z^{\frac{1}{2}(q^2-1)} = (-1)^{\frac{1}{2}(q+1)},$$

dus z is een kwadraat voor $q \equiv -1 \pmod{4}$ en een niet-kwadraat voor $q \equiv 1 \pmod{4}$.

Opgave. Toon aan dat de vergelijking

$$z\bar{z} + \bar{\alpha}z + \alpha\bar{z} = 0, \quad \alpha \in \text{GF}(q^2)$$

q oplossingen $z \neq 0$ heeft.

Opgave. Toon aan dat de vergelijking

$$\bar{\alpha}z + \alpha\bar{z} + \beta\bar{\beta} = 0, \quad \alpha, \beta \in \text{GF}(q^2)$$

q oplossingen z heeft.

Een unitaire ruimte is een vectorruimte $V(d, \mathbb{F})$ voorzien van een niet-ontaarde Hermite-vorm, dat is, een niet-ontaarde sesquilineaire vorm (x, y) met $- \neq \text{id}$, $\forall x, y \in V : ((y, x) = \overline{(x, y)})$.

Zij \mathbb{F}_0 het deellichaam der zelfgeconjugeerde elementen van \mathbb{F} , dan geldt

$$\forall x \in V : ((x, x) \in \mathbb{F}_0).$$

Ten opzichte van een orthogonale basis geldt

$$(x, y) = \lambda_1 x_1 \bar{y}_1 + \dots + \lambda_d x_d \bar{y}_d, \quad 0 \neq \lambda_i \in \mathbb{F}_0.$$

Voor eindige \mathbb{F}_q kunnen wij bereiken

$$(x, y) = x_1 \bar{y}_1 + \dots + x_d \bar{y}_d,$$

omdat bij elke $\lambda \in \mathbb{F}_q$ bestaan $\zeta \in \mathbb{F}_q$ zodat $\zeta \bar{\zeta} = \lambda$. De laatste eigenschap heeft ook ten gevolge dat elke $V(d, \mathbb{F}_q)$ van dimensie ≥ 2 isotroop is. Inderdaad,

voor $x \in V, y \in V$ met $(x,x) = (y,y) = 1, (x,y) = 0$ geldt

$$(x + \zeta y, x + \zeta y) = 1 + \zeta \bar{\zeta},$$

hetgeen nul is voor geschikte $\zeta \in GF(q^2)$. Dit voert tot de volgende standaard vormen, in termen van hyperbolische vlakken H_1 en niet-isotrope p :

$$d \text{ even: } V = H_1 \perp \dots \perp H_{\frac{1}{2}d},$$

$$d \text{ oneven: } V = H_1 \perp \dots \perp H_{\frac{1}{2}(d-1)} \perp \langle p \rangle.$$

Zij $\varphi(d)$ het aantal isotrope vectoren $\neq 0$ in de unitaire ruimte $V(d)$ over $GF(q^2)$.

Stelling. $\varphi(d) = (q^d - (-1)^d)(q^{d-1} - (-1)^{d-1})$.

Bewijs. Schrijf, met hyperbolische $\langle a, b \rangle$,

$$V(d) = H_1 \perp V(d-2) = \langle a, b \rangle \perp V(d-2).$$

De gevraagde $\varphi(d)$ is het aantal vectoren $\alpha a + \beta b + v \neq 0$, zodat $\alpha, \beta \in \mathbb{F}_q$, $v \in V(d-2)$,

$$0 = (\alpha a + \beta b + v, \alpha a + \beta b + v) = \alpha \bar{\beta} + \beta \bar{\alpha} + (v, v).$$

Als $\beta = 0, v = 0$, dan is er één zo'n vector voor elke $\alpha \neq 0$. Als $\beta = 0, v \neq 0$, dan zijn er $\varphi(d-2)$ zulke vectoren voor elke α . Voor elke $\beta \neq 0$, zijn er q^{2d-3} zulke vectoren; inderdaad, voor elke $v \in V(d-2)$ zijn er precies q waarden van α in \mathbb{F}_q zodat

$$\alpha \bar{\beta} + \beta \bar{\alpha} + (v, v) = 0. \text{ Dus}$$

$$\varphi(d) = q^2 - 1 + q^2 \varphi(d-2) + (q^2 - 1) q^{2d-4} q,$$

$$\varphi(d) - q^{2d-1} + 1 = q^2 (\varphi(d-2) - q^{2d-5} + 1).$$

De beginwaarden $\varphi(1) = \varphi(0) = 0$ leiden tot het gestelde.

Een Hermite oppervlak in $PG(d-1, q^2)$ wordt gedefinieerd door

$$\Omega_{d-1} := \{ \langle x \rangle \in PG(d-1, q^2) \mid (x, x) = 0 \}.$$

Ten opzichte van een orthonormale basis in $V(d, q^2)$ is de vergelijking van Ω_{d-1}

$$x_1^{q+1} + x_2^{q+1} + \dots + x_d^{q+1} = 0$$

Opgave. Bepaal de projectieve punten van de Hermite-kromme

$$\Omega_2 := x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = 0$$

in $PG(2, 4)$.

Op grond van bovenstaande stelling bedraagt het aantal projectieve punten van Ω_{d-1}

$$|\Omega_{d-1}| = \frac{(q^d - (-1)^d)(q^{d-1} - (-1)^{d-1})}{q^2 - 1}.$$

In $PG(3, q^2)$ heeft het Hermite oppervlak $(q^2+1)(q^3+1)$ punten. In $PG(2, q^2)$ heeft de Hermite kromme q^3+1 punten. In $PG(1, q^2)$ heeft de Hermite verzameling $q+1$ punten.

Beschouw een punt $\langle p \rangle \in \Omega_{d-1} \subset PG(d-1, q^2)$, het raakvlak in $\langle p \rangle$ aan Ω_{d-1} is het poolvlak

$$\langle p \rangle^\perp = \{ \langle x \rangle \in PG(d-1, q^2) \mid (x, p) = 0 \}.$$

De lijnen door $\langle p \rangle$ in het raakvlak vormen de punten van een projectieve ruimte $PG(d-3, q^2)$, waarop $(\ , \)$ een Hermite vorm induceert. Inderdaad, voor $x, x' \in \langle p \rangle^\perp$ voldoen $y = x - \lambda p$ en $y' = x' - \mu p$ aan

$$(y, y') = (x - \lambda p, x' - \mu p) = (x, x').$$

Als $\langle x \rangle \in \Omega_{p-1} \cap \langle p \rangle^\perp$, dan ook $\langle x - \lambda p \rangle \in$

$\Omega_{p-1} \cap \langle p \rangle^\perp$ voor elke $\lambda \in GF(q^2)$.

Lemma. Elke lijn van $PG(d-1, q^2)$ door $\langle p \rangle \in \Omega_{d-1}$, die niet ligt in $\langle p \rangle^\perp$, bevat nog precies q andere punten van Ω_{d-1} .

Bewijs. Geef de lijn aan door $\langle p + \lambda a \rangle$ met $(p, a) \neq 0$, dan geldt voor de snijpunten van de lijn met Ω_{d-1}

$$0 = (p + \lambda a, p + \lambda a) = \lambda \bar{\lambda} (a, a) + \lambda (a, p) + \bar{\lambda} (p, a).$$

In het complexe λ -vlak is dit een cirkel. Er zijn q oplossingen $\lambda \neq 0$, die q snijpunten $\neq \langle p \rangle$ opleveren.

Wij geven een projectieve interpretatie van de formule

$$\frac{\varphi(d)}{q^2 - 1} = 1 + q^2 \frac{\varphi(d-2)}{q^2 - 1} + q \cdot q^{2(d-2)}.$$

De punten van Ω_{d-1} worden geteld door één punt

$\langle p \rangle \in \Omega_{d-1}$, de punten $\neq \langle p \rangle$ van

$\Omega_{d-1} \cap \langle p \rangle^\perp$ (in het raakvlak) en de punten van

Ω_{d-1} niet in het raakvlak. Elk punt van Ω_{d-3} , in de boven beschreven $PG(d-3, q^2)$ levert q^2 punten van

Ω_{d-1} . Elke projectieve lijn door $\langle p \rangle$ en niet in $\langle p \rangle^\perp$ levert q punten van Ω_{d-1} ; het aantal van zulke lijnen bedraagt

$$\frac{(q^2)^{d-1} - 1}{q - 1} - \frac{(q^2)^{d-2} - 1}{q^2 - 1} = q^{2d-4}.$$

Hiermee is een projectieve interpretatie van de formule verkregen.

Opgave. In $PG(3,4)$ is het Hermite oppervlak een kubisch oppervlak. Toon aan dat het oppervlak 45 punten bevat, 3 lijnen per punt, 5 punten per lijn, en 27 lijnen.

Opgave. Toon aan dat in $PG(2, q^2)$ de punten van Ω_2 en de anijlijnen van Ω_2 (in de zin van het lemma) een $2 - (q^3+1, q+1, 1)$ design vormen. Dit design heet een unital.

De unitaire groep $U(V)$ is de groep der isometrien ten opzichte van de Hermite vorm:

$$U(V) := \{ \sigma \in GL(V) \mid \forall x, y \in V : ((x^\sigma, y^\sigma) = (x, y)) \}.$$

Voor de structuur van de unitaire groep zie [9], Chapter 5 "The unitary group". Weer geldt de stelling van Witt ([9], 5.32).

De projectieve unitaire groep $PU(d, q^2)$ is de actie van de unitaire groep op de punten van $PG(d-1, q^2)$. Deze actie is natuurlijk niet transitief omdat een niet-isotroop punt niet in een isotroop punt kan worden overgevoerd. $PU(d, q^2)$ werkt wel transitief op de punten van het Hermite-oppervlak Ω_{d-1} , op de paren loodrechte punten van Ω_{d-1} , en op de paren der niet-loodrechte punten van Ω_{d-1} . Dit volgt uit de boven afgeleide standaardvorm voor Ω_{d-1} . Dit betekent dat $PU(d, q^2)$ als een rang 3 groep werkt op de punten van Ω_{d-1} .

Opgave. Bepaal de parameters van de hierdoor gedefiniëerde sterk reguliere graaf.

Op de punten van $PG(d-1, q^2) \setminus \Omega_{d-1}$ werkt $PU(d, q^2)$ eveneens transitief. Het aantal van deze punten is

$$u_{d-1} = |PG(d-1, q^2)| - |\Omega_{d-1}| = \frac{q^{d-1}(q^d + (-1)^{d-1})}{q+1}.$$

Noem twee punten $\langle c \rangle \neq \langle d \rangle \notin \Omega_{d-1}$ verbonden als $(c,d) = 0$, dan ontstaat er een transitieve graaf met de parameters

$$n = u_{d-1}, \quad k = u_{d-2}, \quad \lambda = u_{d-3},$$

maar de μ hoeft niet constant te zijn. Voor $q = 2$ geldt echter $\mu = 4u_{d-4}$ en is de graaf sterk regulier.

Voorbeeld. Op de punten van $PG(3,4) \setminus \Omega_3$ definieert loodrechtetheid een sterk reguliere graaf met $(n,k,\lambda,\mu) = (40,12,2,4)$.

4.5. Orthogonale meetkunde, char $\mathbb{F} = 2$.

\mathbb{F} , met $\text{char } \mathbb{F} = p$ heet perfect wanneer $\mathbb{F}^p \cong \mathbb{F}$. Een eindig lichaam met karakteristiek 2 is perfect wegens

$$(\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2, \quad (\alpha\beta)^2 = \alpha^2\beta^2, \quad -1 = 1.$$

Wij onderzoeken de meetkunde van $V(d, \mathbb{F})$ en $PG(d-1, \mathbb{F})$ met eindige \mathbb{F} en $\text{char } \mathbb{F} = 2$, eerst met een symmetrische bilineaire vorm (II blz. 40), daarna met de kwadratische vormen behorend bij een alternerende bilineaire vorm (I blz. 40).

Zij f een niet-ontaarde symmetrische bilineaire vorm voor V . Dan lezit V een basis die orthonormaal is t.o.v. f . Inderdaad, bij definitie en perfectie is er een e_1 zodat $f(e_1, e_1) = 1$. Stel dat de restrictie van f op $\langle e_1 \rangle^\perp$ alternerend is, dan zijn er $e_2, e_3 \in V$ zodat

$$[f(e_i, e_j)] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Dan vormen $e_1+e_2+e_3, e_1+e_2, e_1+e_3$ een orthonormale basis voor $\langle e_1, e_2, e_3 \rangle$. Gebruik verder inductie. Ten opzichte van de orthonormale basis geldt

$$f(x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_d y_d.$$

De isotrope punten voldoen aan

$$0 = f(x, x) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_d^2 = (x_1 + x_2 + \dots + x_d)^2,$$

dus zijn de punten van een hypervlak.

Wij wenden ons tot de meer interessante verfijning van de symplectische meetkunde, genaamd de orthogonale meetkunde char $\mathbb{F} = 2$, die ontstaat door beschouwing van kwadratische vormen. Deze worden gedefinieerd door

$$Q(\lambda x + \mu y) = \lambda^2 Q(x) + \lambda \mu (x, y) + \mu^2 Q(y),$$

waarin (x, y) een alternerende bilineaire vorm is.

Zij $V(2m, \mathbb{F})$ een niet-ontaarde symplectische ruimte met alternerende bilineaire vorm $(,)$. Hierbij behoort een semi-lineaire familie van kwadratische vormen. Inderdaad als $Q(x)$ een kwadratische vorm is bij $(,)$, dan ook $Q(x) + L(x)$, met $L(x)$ semi-lineair t.o.v. het Frobenius-automorfisme $\lambda \rightarrow \lambda^2$. Ontbind $V(2m, \mathbb{F})$ volgens $(,)$ in hyperbolische vlakken

$$V = H_1 \perp H_2 \perp \dots \perp H_m.$$

Voor $z = z_1 + z_2 + \dots + z_m$ met $z_i \in H_i$ geldt

$$Q(z) = Q(z_1) + Q(z_2) + \dots + Q(z_m)$$

Wij onderzoeken eerst het gedrag van Q op een hyperbolisch vlak H . Zij u, v een symplectische basis voor H , dus zij

$$\begin{bmatrix} (u,u) & (u,v) \\ (v,u) & (v,v) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} .$$

Zij $Q(u) = \alpha$, $Q(v) = \beta$, dan geldt

$$Q(\xi_1 u + \xi_2 v) = \alpha \xi_1^2 + \xi_1 \xi_2 + \beta \xi_2^2$$

Als $\alpha = 0$ dan kan $\beta = 0$ worden gemaakt door v te vervangen door $v' = v + \beta u$, omdat

$$(u, v') = 1, \quad Q(v') = Q(v) + \beta + 0 = \beta + \beta = 0.$$

Als $\alpha\beta \neq 0$ dan kan $\alpha = 1$ worden gemaakt door

$$u' = u/\sqrt{\alpha}, \quad v' = v\sqrt{\alpha}. \quad \text{Er blijft dus:}$$

$$Q(\xi_1 u' + \xi_2 v') = \xi_1 \xi_2, \quad \text{noem type A,$$

$$Q(\xi_1 u + \xi_2 v) = \xi_1^2 + \xi_1 \xi_2 + \beta \xi_2^2, \quad \text{noem type B .}$$

Beschouw nu $V(4, \mathbb{F}) = B \perp B$, dat is, $V = \langle u_1, v_1, u_2, v_2 \rangle$ met $(u_1, v_1) = (u_2, v_2) = 1$, overige $(,) = 0$,

$$Q(u_1) = Q(u_2) = 1, \quad Q(v_1) = \beta_1, \quad Q(v_2) = \beta_2.$$

Neem als nieuwe basis $\langle u_1 + u_2, v_2 \rangle$ en $\langle u_1, v_1 + v_2 \rangle$,

dan $Q(u_1 + u_2) = 0$, $Q(v_2) = \beta_2$, $Q(u_1) = 1$, $Q(v_1 + v_2) = \beta_1 + \beta_2$,

en wij kunnen bereiken

$$V(4, \mathbb{F}) = A \perp (B \text{ of } A).$$

Door iteratie vinden wij

$$V(2m, \mathbb{F}) = A \perp A \perp \dots \perp A \quad \text{of}$$

$$V(2m, \mathbb{F}) = B \perp A \perp \dots \perp A.$$

De bijbehorende kwadratische vormen zijn

$$Q^+(x) := \xi_1 \xi_2 + \xi_3 \xi_4 + \dots + \xi_{2m-1} \xi_{2m},$$

$$Q^\beta(x) := \xi_1^2 + \xi_1 \xi_2 + \beta \xi_2^2 + \xi_3 \xi_4 + \dots + \xi_{2m-1} \xi_{2m}.$$

Opmerking. β modulo $\{k^2 + k \mid k \in \mathbb{F}\}$ is de Arf invariant van Q , zie [12], 1.12. In het geval $\mathbb{F} = \mathbb{F}_2$ is $\beta \in \{0, 1\}$.

Stelling. $V(2m, \mathbb{F}_2)$ heeft twee soorten kwadratische vormen namelijk

$$Q^+(x) := \xi_1 \xi_2 + \xi_3 \xi_4 + \dots + \xi_{2m-1} \xi_{2m}$$

$$Q^-(x) := \xi_1^2 + \xi_1 \xi_2 + \xi_2^2 + \xi_3 \xi_4 + \dots + \xi_{2m-1} \xi_{2m}$$

$Q^\varepsilon(x)$ heeft $2^{2m-1} + \varepsilon \cdot 2^{m-1}$ nulpunten, $\varepsilon \in \{+, -\}$.

Bewijs. De gedaante van $Q^\varepsilon(x)$ volgt uit het bovenstaande. Voor het tellen van het aantal nulpunten van $Q^+(x)$ en dat van $Q^-(x)$ merken wij eerst op dat deze aantallen de som 2^{2m} hebben. Inderdaad,

$$Q^-(x+e) = 1 + Q^+(x), \quad \text{voor } e = (1, 1, 0, \dots, 0),$$

en voor alle $x \in V(2m, \mathbb{F}_2)$. Nu bestaat $\Lambda \perp \Lambda \perp \dots \perp \Lambda$ uit de vectoren $x+y$ met $x \in X$, $y \in Y$, waarin X en Y m -dimensionale deelruimten van $V(2m, \mathbb{F}_2)$ zijn waarop Q^+ nul is. Het aantal vectoren $x+y$ met $Q^+(x+y) = (x, y) = 0$ bedraagt $2^m + (2^m - 1) 2^{m-1}$, namelijk 2^m voor $x=0$, en 2^{m-1} voor elke $x \neq 0$.

De verzameling $V(2m, \mathbb{F}_2) \setminus \{0\}$ kan worden beschouwd als de verzameling \mathcal{P} der projectieve punten van $PG(2m-1, \mathbb{F}_2)$. In \mathcal{P} definiëren wij de kwadrieken

$$\Omega^\varepsilon := \{x \in \mathcal{P} \mid Q^\varepsilon(x) = 0\}, \quad \varepsilon \in \{+, -\}.$$

Volgens de stelling geldt (vgl. $\varphi(d)$ uit 4.3)

$$|\Omega^\varepsilon| = 2^{2m-1} + \varepsilon \cdot 2^{m-1} - 1 = (2^m - \varepsilon)(2^{m-1} + \varepsilon).$$

De symplectische groep $Sp(2m, \mathbb{F}_2)$ is de groep der isometrien t.o.v. $(\ , \)$ van V op zich zelf. De orthogonale groep $O^\varepsilon(2m, \mathbb{F}_2)$ is de groep der isometrien t.o.v. Q^ε van V op zichzelf. $Sp(2m, \mathbb{F}_2)$ werkt op \mathcal{P} als een rang 3 groep: transitief op de punten, op de paren punten met $(x, y) = 0$, en op de paren punten met $(x, y) = 1$. $O^\varepsilon(2m, \mathbb{F}_2)$ werkt als een rang 3 groep op Ω^ε , en ook op $\mathcal{P} \setminus \Omega^\varepsilon$. Dit levert 5 series van sterk-reguliere grafen, genaamd $S(2m, 2)$ op \mathcal{P} , $O^\varepsilon(2m, 2)$ op Ω^ε , en $N^\varepsilon(2m, 2)$ op $\mathcal{P} \setminus \Omega^\varepsilon$, waarin steeds x en y verbonden zijn wanneer $(x, y) = 0$. De parameters zijn als volgt (ga dit na!):

$$\begin{aligned} S(2m, 2) : \quad n &= 2^{2m-1}, \quad k = 2^{2m-1} - 2, \quad \lambda = 2^{2m-2} - 3, \\ &\quad \mu = 2^{2m-2} - 1; \\ O^\varepsilon(2m, 2) : \quad n &= 2^{2m-1} + \varepsilon \cdot 2^{m-1} - 1, \quad k = 2^{2m-2} + \varepsilon \cdot 2^{m-1} - 2, \\ &\quad \lambda = 2^{2m-3} + \varepsilon \cdot 2^{m-1} - 3, \quad \mu = 2^{2m-3} + \varepsilon \cdot 2^{m-2} - 1; \\ N^\varepsilon(2m, 2) : \quad n &= 2^{2m-1} - \varepsilon \cdot 2^{m-1}, \quad k = 2^{2m-2} - \varepsilon \cdot 2^{m-1}, \\ &\quad \lambda = 2^{2m-3} - \varepsilon \cdot 2^{m-2}, \quad \mu = 2^{2m-3} - \varepsilon \cdot 2^{m-1}. \end{aligned}$$

De grafen $S(2m-2)$ op \mathcal{P} en $O^\varepsilon(2m, 2)$ op Ω^ε hebben de volgende eigenschap.

Triangle property: bij elk paar verbonden punten u en v behoort een punt $f(u, v)$, verbonden met beide, zodat elk overig punt van de graaf verbonden is met één of drie van $u, v, f(u, v)$.

Inderdaad, $u+v$ voldoet als $f(u, v)$ omdat

$$(u+v, u) = (u+v, v) = (u, v) = 0,$$

$$(u, x) + (v, x) + (u+v, x) = 0,$$

en (voor het geval $\sigma^{\epsilon}(2m, 2)$)

$$Q(u+v) = Q(u) + Q(v) + (u, v) = 0 + 0 + 0 = 0.$$

De grafen $S(2m, 2)$ op \mathcal{P} en $N^{\epsilon}(2m, 2)$ op $\mathcal{P} \setminus \Omega^{\epsilon}$ hebben de volgende eigenschap.

Cotriangle property: bij elk niet-verbonden paar punten u en v behoort een punt $g(u, v)$, niet-verbonden met beide, zodat elk overig punt van de graaf verbonden is met één of drie van $u, v, g(u, v)$.

Inderdaad, $u+v$ voldoet als $g(u, v)$ omdat

$$(u+v, u) = (u+v, v) = (u, v) = 1,$$

$$(u, x) + (v, x) + (u+v, x) = 0,$$

en (voor het geval $N^{\epsilon}(2m, 2)$)

$$Q(u+v) = Q(u) + Q(v) + (u, v) = 1 + 1 + 1 = 1.$$

Opmerking. In essentie worden $S(2m, 2)$ en $\sigma^{\epsilon}(2m, 2)$ gekarakteriseerd door de triangle property. In essentie worden $S(2m, 2)$ en $N^{\epsilon}(2m, 2)$ gekarakteriseerd door de cotriangle property (ook het complement van de triangulaire graaf $T(m)$ voldoet). Zie hierover [19] en

E.E. Shult, Groups, polar spaces and related structures,
Nijenrode conference, MC. Tract 57 (1974)
130-161.

In het voorgaande hebben wij verondersteld dat $V(d, \mathbb{F})$ een niet-ontaarde symplectische ruimte is, dus dat $V^{\perp} = \{0\}$. Dit kan alleen als d even is. Wanneer V

ontaard is, dan geldt $V \cap V^\perp \neq \{0\}$.

De definitie van een kwadratische vorm

$$Q(\lambda x + \mu y) = \lambda^2 Q(x) + \mu^2 Q(y) + \lambda \mu (x, y)$$

geldt ook voor ontaarde alternerende bilineaire vormen $(\ , \)$. Wij noemen (V, Q) niet-singulier als

$$\forall 0 \neq x \in V^\perp : (Q(x) \neq 0),$$

en singulier als $Q(x) = 0$ op een deelruimte $\neq \{0\}$ van $V \cap V^\perp$. Een singuliere V is isotroop, maar niet omgekeerd (ga na).

Voorbeeld. In $V(3, \mathbb{F}_2)$ is de standaardvorm $x_1 y_2 + x_2 y_1$. Equivalent hiermee is

$$(x, y) = x_1 y_2 + x_2 y_1 + x_1 y_3 + x_3 y_1 + x_2 y_3 + x_3 y_2,$$

$$V^\perp = \{x \in V \mid \forall y \in V : ((x, y) = 0)\} = \langle (1, 1, 1) \rangle.$$

De 8 bijbehorende kwadratische vormen zijn

$$Q(x) = \sum_{i=1}^3 \varepsilon_i x_i + x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3, \quad \varepsilon_i \in \{0, 1\}.$$

Deze zijn niet-singulier als $\sum \varepsilon_i = 0$, en singulier als $\sum \varepsilon_i = 1$.

Voorbeeld. In $V(4, \mathbb{F}_2)$ is de standaard vorm

$$x_1 y_2 + x_2 y_1 + x_3 y_4 + x_4 y_3.$$

Equivalent hiermee is

$$(x, y) = \sum_{i \neq j} x_i y_j.$$

De 16 bijbehorende kwadratische vormen

$$Q(x) = \sum \varepsilon_i x_i + \sum_{i < j} x_i x_j, \quad \varepsilon_i \in \{0, 1\},$$

zijn alle niet-singulier.

Opgave. In $V(4, \mathbb{F}_2)$ zijn zowel $\sum_{i < j} x_i x_j$ als $\sum_{i \leq j} x_i x_j$ van het type $Q^-(x)$. Welke $Q(x)$ zijn van het type $Q^+(x)$?

Opgave. In $V(6, \mathbb{F}_2)$ is $\sum_{i \leq j} x_i x_j$ van het type $Q^+(x)$ en $\sum_{i < j} x_i x_j$ van type $Q^-(x)$. Hoe zit dat in $V(2m, \mathbb{F}_2)$?

Zij $B(x, y)$ een niet-ontaarde alternerende bilineaire vorm op $V(2m, \mathbb{F}_2)$, en zij $Q^\varepsilon(x)$ een daarbij behorende kwadratische vorm. Beschouw de $2^{2m} \times 2^{2m}$ matrices

$$B := [B(x, y)]_{x, y \in V}, \quad Q^\varepsilon := [Q^\varepsilon(x+y)]_{x, y \in V}.$$

Opgave. Bewijs dat $[B \quad J-B]$ een $(2^{2m+1}, 2^{2m}, 2^{2m-1})$ -code is. Interpreteer 0, 1 als elementen van \mathbb{Z} en bewijs dat $2B-J$ een Hadamard matrix is.

Opgave. Bewijs dat Q^ε per rij $2^{2m-1} - \varepsilon 2^{m-1}$ enen heeft. Maak een Hadamard matrix van Q^ε .

Zij \mathcal{B} de vectorruimte van alle (ook de ontaarde, ook nul) alternerende bilineaire vormen $B(x, y) = x^t B y$ op $V(2m, \mathbb{F}_2)$, met

$$(B_1 + B_2)(x, y) := B_1(x, y) + B_2(x, y).$$

Zij \mathcal{Q} de vectorruimte van alle mogelijke kwadratische vormen $Q(x)$ op $V(2m, \mathbb{F}_2)$, met

$$(Q_1 + Q_2)(x) := Q_1(x) + Q_2(x).$$

Opgave. Bewijs dat $\dim \mathcal{B} = m(2m-1)$, $\dim \mathcal{Q} = m(2m+1)$. Wat is het verband tussen \mathcal{B} en \mathcal{Q} ?

4.6. Polaire ruimten.

De voorgaande paragrafen zijn gewijd aan de zogenaamde klassieke meetkunden, hun isotrope punten en hun totaal isotrope deelruimten. In elk der gevallen draagt de verzameling der isotrope punten drie soorten structuur.

- I. Orde-structuur: de totaal isotrope deelruimten, partieel geordend door inclusie.
- II. Lijn-structuur: de punten en de lijnen zijn de isotrope punten en de totaal isotrope lijnen.
- III. Graaf-structuur: de knopen zijn de isotrope punten; twee knopen zijn verbonden als de corresponderende isotrope punten op een totaal isotrope lijn liggen.

Deze structuren zijn gelijkwaardig. De doorsnede van de totaal isotrope deelruimten door twee punten (volgens I) geeft de lijn door die punten (volgens II). Twee punten op een lijn (volgens II) zijn verbonden (volgens III). De maximale cliques (volgens III) zijn de maximale totaal isotrope deelruimten (volgens I), en elke totaal isotrope deelruimte is de doorsnede van twee maximale totaal isotrope deelruimten. Deze laatste uitspraak volgt uit de standaard Gram matrix

$$\begin{bmatrix} \boxed{0} & 0 & I & \boxed{0} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I & 0 \\ \hline +I & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \boxed{0} & +I & 0 & \boxed{0} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G \end{bmatrix}$$

In de polaire meetkunde stelt men axiomas op voor deze structuren, teneinde de klassieke meetkunden te karakteriseren. Soms levert dit extra mogelijkheden, ook wanneer men zich beperkt tot eindige structuren. Het verst in deze richting gaan Buekenhout en Shult []

met de volgende definitie voor een structuur van de soort II.

Een prepolaire ruimte is een incidentie structuur $(\mathcal{P}, \mathcal{L})$ van punten en lijnen (met ≥ 2 punten) zodat elke $P \in \mathcal{P}$ en $l \in \mathcal{L}$ met $P \notin l$ voldoen aan de eigenschap: P is verbonden met één of alle punten van l .

Voorbeeld. De isotrope punten \mathcal{P} en de totaal isotrope lijnen \mathcal{L} van een klassieke meetkunde vormen een prepolaire ruimte. Inderdaad, voor gegeven $P \notin l$ geldt ofwel $P \in l^\perp$ dus $Q := P^\perp \cap l$ is het enige punt van l verbonden met P door een lijn uit \mathcal{L} , ofwel $P \in l^\perp$ dus $l \in P^\perp$ en alle punten van l zijn verbonden met P door lijnen uit \mathcal{L} .

Voorbeeld. Een cocktail party graaf Γ is het complement van een 1-factor:

$$\Gamma = \text{compl. } \begin{array}{cccc} \circ & \circ & \circ & \circ \\ | & | & | & | \\ \circ & \circ & \circ & \circ \end{array} \dots \begin{array}{c} \circ \\ | \\ \circ \end{array}$$

De knopen en de verbindingen van Γ vormen een prepolaire ruimte, die "mager" is in de zin dat elke lijn twee punten heeft. De maximale cliques in Γ komen overeen met de maximale totaal isotrope deelruimten.

Voorbeeld. Een gegeneraliseerde vierhoek is een prepolaire ruimte, omdat daarin elk punt P verbonden is met één punt van elke lijn $l \not\ni P$.

Een prepolaire ruimte heet niet-ontaard als er geen punt bestaat dat met alle andere punten van \mathcal{P} verbonden is door lijnen van \mathcal{L} . Buckenhout en Shult [] bewijzen dat in een niet-ontaarde prepolaire ruimte door elk tweetal punten ten hoogste één lijn gaat.

Een lineaire deelruimte van een prepolaire ruimte is een deelverzameling van paarsgewijs verbonden punten die met twee punten alle punten van een lijn bevat. De rang van een prepolaire ruimte is de lengte van een maximale vlag

van lineaire deelruimten. Voor een niet-ontaarde prepolaire ruimte tonen Buekenhout en Shult de structuur I van een polaire ruimte in de zin van Tits aan. *) met lijnen van ≥ 3 punten

Een polaire ruimte van rang n is een verzameling S (van punten) en een collectie van deelverzamelingen (genaamd lineaire deelruimten) die voldoen aan

- (i) een lineaire deelruimte met de daarin bevatte lineaire deelruimten vormt een projectieve ruimte van dimensie d , met $-1 \leq d \leq n-1$,
- (ii) de doorsnede van twee lineaire deelruimten is een lineaire deelruimte,
- (iii) voor een gegeven lineaire deelruimte D van dimensie $n-1$ en een punt $P \in S \setminus D$ is er een unieke lineaire deelruimte E zodat $P \in E$, $\dim D \cap E = n-2$, en E bevat elk punt van D dat collineair is met P .
- (iv) er bestaan disjuncte lineaire deelruimten van dimensie $n-1$.

Tits [21] en Veldkamp hebben de polaire ruimten van rang ≥ 3 geklassificeerd. In het eindige geval zijn dit juist de in dit hoofdstuk behandelde klassieke polaire ruimten. De polaire ruimten van rang 2 zijn de gegeneraliseerde vierhoeken (voor de klassieke gegeneraliseerde vierhoeken zie [4], pag 301).

Ook voor de grafenstructuur, III is er een karakterisering, Stelling (Buekenhout-Shult). Zij Γ een eindige graaf met de volgende eigenschap. Elke verbinding ligt in een clique Δ van afmeting ≥ 3 zodat elke knoop buiten Δ is verbonden met één of alle knopen van Δ . Dan geldt één van de volgende mogelijkheden:

- (i) Γ bevat een knoop verbonden met alle andere knopen,
- (ii) Γ is de lege graaf,
- (iii) $\Gamma = \Gamma(\pi)$, waarin π een polariteit of een niet-ontaarde kwadratische vorm is op een projectieve ruimte \mathcal{P} ; de knopen van $\Gamma(\pi)$ zijn de isotrope of de singuliere punten van \mathcal{P} , die verbonden zijn als zij loodrecht zijn,

(iv) De cliques Δ van Γ zijn maximale cliques; de knopen en de cliques van Γ vormen een gegeneralizeerde vierhoek.

Literatuur

F. Buekenhout, E. Shult, On the foundations of polar spaces, Geom. Dedic. 3 (1974), 155-170.

E.E. Shult, Groups, polar spaces and related structures Proc. Nijenrode conf. , M.C. Tract 57 (1974) 130-161.

5. Kwadratische verzamelingen

5.1. Ovalen.

Een ovaal in een projectief vlak $PG(2,n)$ is een verzameling van $n+1$ punten waarvan geen drie collineair zijn. Een secant, tangent, passant, van een ovaal is een lijn die respectievelijk 2,1,0 snijpunten met de ovaal heeft.

Opgave. Door elk punt van een ovaal gaat één tangent. Een ovaal heeft $n+1$ tangenten, $\frac{1}{2}n(n+1)$ secanten en $\frac{1}{2}n(n-1)$ passanten. Bewijs dit.

Stelling (Qvist). In $PG(2,n)$, n even, gaan alle tangenten aan een ovaal door één punt.

Bewijs. Zij $n=2m$. Omdat de ovaal een oneven aantal punten heeft, gaat er door elk punt van elke secant tenminste één tangent. Omdat de ovaal in totaal $2m+1$ tangenten heeft, gaat er door elk punt van elke secant precies één tangent. Het snijpunt van twee tangenten kan dus slechts door tangenten worden verbonden met de punten van de ovaal. Daarom ligt dit snijpunt op alle tangenten. Dit snijpunt heet de nuclous van de ovaal.

Als gevolg van deze stelling laat elke ovaal in $PG(2, 2m)$ zich uitbreiden tot een verzameling K van $2m+2$ punten waarvan geen drie punten collineair zijn. Elk punt $\notin K$ ligt op $m+1$ secanten en op m passanten van K . Elke secant bevat $2m-1$ punten $\in K$.

Opgave. De graaf Γ wordt gedefinieerd op de punten van $\mathcal{P} \setminus K$, en twee punten zijn verbonden wanneer hun verbindingslijn een secant van K is. Bewijs dat Γ een sterk reguliere graaf is en bepaal de parameters. Construeer een symmetrische Hadamard matrix met een constante diagonaal, door de graaf Γ uit te breiden met een geïsoleerd punt.

Opgave. Bewijs dat in $PG(2, 2m+1)$ geen drietal tangenten aan een ovaal door één punt gaat.

Vervolgens beschouwen wij een Desargues vlak $PG(2, q)$, $q = p^r$, $p \neq 2$ priem, afkomstig van de vectorruimte $V(3, \mathbb{F}_q)$. Een kegelsnede is de verzameling

$$\{ \langle x \rangle \in PG(2, q) \mid Q(x) = 0 \}$$

waarin $Q(x)$ een niet-singuliere kwadratische vorm op V is. Een kegelsnede is een ovaal. Wij willen omgekeerd bewijzen dat elke ovaal een kegelsnede is (vermoeden van Kustaanheimo, bewezen door Segre).

Lemma. In $PG(2, q)$ liggen de driehoek gevormd door 3 punten van een ovaal en de driehoek gevormd door de tangenten in deze punten perspectivisch.

Bewijs. Neem $\langle e_1 \rangle, \langle e_2 \rangle, \langle e_3 \rangle, \langle p \rangle$ op de ovaal K . Geef de lijnen $\langle e_i, p \rangle$ $i = 1, 2, 3$, de vergelijking

$$x_2 = \lambda_1 x_3 \quad ; \quad x_3 = \lambda_2 x_1 \quad ; \quad x_1 = \lambda_3 x_2 \quad ,$$

met $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 1$. Laat de tangenten in $\langle e_1 \rangle, \langle e_2 \rangle,$

$\langle e_3 \rangle$ tot vergelijking hebben

$$t_1: x_2 = \alpha_1 x_3; \quad t_2: x_3 = \alpha_2 x_1; \quad t_3: x_1 = \alpha_3 x_2.$$

Neem $i \in \{1, 2, 3\}$. Wanneer $\langle p \rangle$ alle punten $\neq \langle e_i \rangle, \langle e_j \rangle, \langle e_k \rangle$ van K doorloopt, dan doorloopt λ_i alle waarden van \mathbb{F}_q behalve 0 en α_i , dus

$$\alpha_i \prod \lambda_i = -1.$$

Vermenigvuldig, voor $i = 1, 2, 3$, dan $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 = -1$. Hier uit volgt dat de verbindinglijnen van $\langle e_i \rangle$ en $t_j \cap t_k$ (verschillende $i, j, k \in \{1, 2, 3\}$) door één punt U gaan (ga na!). Wanneer wij $U = \langle e_1 + e_2 + e_3 \rangle$ nemen dan geldt $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = -1$.

Stelling. In een Desargues vlak van oneven orde is elke ovaal een kegelsnede.

Bewijs. Neem $\langle e_1 \rangle, \langle e_2 \rangle, \langle e_3 \rangle, \langle e_1 + e_2 + e_3 \rangle$ als in het lemma. Dan heeft niet alleen de ovaal K , maar ook de kegelsnede

$$C = \{ \langle x \rangle \in PG(2, q) \mid x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_1 = 0 \}$$

in zijn punten $\langle e_i \rangle$ de tangent t_i met $\alpha_i = -1$.

Wij gaan bewijzen dat $(\langle p \rangle \in K) \implies (\langle p \rangle \in C)$. Laat $P = \langle (p_1, p_2, p_3) \rangle$ en $t: b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 = 0$ een punt en de bijbehorende tangent aan K zijn. Pas het lemma toe op de driehoek $\langle e_i \rangle, \langle e_j \rangle, \langle p \rangle$ dan volgt $b_2(p_1 + p_2) = b_3(p_1 + p_3)$ en cyclisch. De eis dat P op t ligt voert dan tot het gestelde.

Opgave. Vul de details in, bij het bovenstaande bewijs.

Opmerking. De zojuist bewezen stelling van Segre geldt niet in een Desargues vlak van even orde ≥ 8 . Inderdaad, beschouw de kegelsnede C in $PG(2, 2^k)$ en vervang één van zijn punten door zijn nucleus. De verkregen ovaal heeft

meer dan 7 punten gemeen met de oorspronkelijke kegelsnede. Daarom is deze ovaal geen kegelsnede (twee kegelsneden hebben immers ten hoogste 4 punten gemeen).

5.2. De kwadriek van Klein.

Wij gaan de lijnen van $PG(3, \mathbb{F})$ beschrijven met behulp van zes Plücker coördinaten.

Beschouw twee vectoren a en b in $V(d, \mathbb{F})$. Wij gebruiken $a \wedge b$ als bilineair alternierend symbool voor het paar a en b , dat is,

$$a \wedge a = 0, \quad a \wedge b = -b \wedge a, \quad a \wedge (b+c) = a \wedge b + a \wedge c, \quad a \wedge (\lambda b) = \lambda(a \wedge b).$$

Op een constante na bepaalt $a \wedge b$ de deelruimte $\langle a, b \rangle$, omdat

$$(\lambda a + \mu b) \wedge (\rho a + \sigma b) = (\lambda \sigma - \mu \rho)(a \wedge b).$$

Ten opzichte van de basis e_1, e_2, \dots, e_d van $V(d, \mathbb{F})$ geldt

$$a \wedge b = \left(\sum_i \alpha_i e_i \right) \wedge \left(\sum_i \beta_i e_i \right) = \sum_{i < j} (\alpha_i \beta_j - \alpha_j \beta_i) e_i \wedge e_j.$$

De Plücker coördinaten van $a \wedge b$ zijn de $\frac{1}{2}d(d-1)$ coördinaten

$$p_{ij} := \alpha_i \beta_j - \alpha_j \beta_i; \quad i < j; \quad i, j = 1, \dots, d.$$

Stelling. In $V(4, \mathbb{F})$ geldt voor de zes coördinaten van $a \wedge b$,

$$p_{12}p_{34} + p_{23}p_{14} + p_{31}p_{24} = 0.$$

Bewijs. Wegens $p_{ij} = -p_{ji}$ geldt het volgende :

$$\begin{bmatrix} 0 & p_{12} & p_{13} & p_{14} \\ p_{21} & 0 & p_{23} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & 0 & p_{34} \\ p_{41} & p_{42} & p_{43} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & p_{43} & p_{24} & p_{32} \\ p_{34} & 0 & p_{41} & p_{13} \\ p_{42} & p_{14} & 0 & p_{21} \\ p_{23} & p_{31} & p_{12} & 0 \end{bmatrix} = I_4 (p_{12}p_{34} + p_{23}p_{14} + p_{31}p_{24}).$$

De linker matrix heeft rang 2, omdat

$$\text{rang} [\alpha_i \beta_j - \alpha_j \beta_i] \leq \text{rang} [\alpha_i \beta_j] + \text{rang} [\alpha_j \beta_i] = 1+1.$$

Daarom is rechts de determinant, dus de factor nul.

De uitdrukking $p_{12}p_{34} + p_{23}p_{14} + p_{31}p_{24} = 0$ is de vergelijking van een hyperbolische kwadriek Ω^+ in $\text{PG}(5, \mathbb{F})$. met coördinaten $(p_{23}, p_{31}, p_{12}, p_{14}, p_{24}, p_{34})$. Dit is de Klein kwadriek.

Stelling. Er is een bijectie tussen de rechten van $\text{PG}(3, \mathbb{F})$ en de punten van de Klein kwadriek Ω^+ .

Bewijs. Een rechte in $\text{PG}(3, \mathbb{F})$ correspondeert met een vlak in $V(4, \mathbb{F})$, dus met een $a \wedge b$, dus met zes coördinaten die voldoen aan de vergelijking van de kwadriek. Omgekeerd behoort er precies één rechte in $\text{PG}(3, \mathbb{F})$ bij gegeven p_{ij} , niet alle nul, die voldoet aan de vergelijking van Ω^+ . Inderdaad, de projectieve punten

$(0, p_{12}, p_{13}, p_{14}), (p_{21}, 0, p_{23}, p_{24}), (p_{31}, p_{32}, 0, p_{34})$ en $(p_{41}, p_{42}, p_{43}, 0)$ zijn collineair, en de $a \wedge b$ van elk tweetal heeft Plücker coördinaten evenredig met p_{ij} .

Stelling. Twee lijnen in $\text{PG}(3, \mathbb{F})$ met Plücker coördinaten p_{ij} en q_{ij} snijden elkaar dan en slechts dan als

$$B(p_{ij}, q_{ij}) := p_{12}q_{34} + p_{34}q_{12} + p_{23}q_{14} + p_{14}q_{23} + p_{31}q_{24} + p_{24}q_{31} = 0.$$

Bewijs. Stel de lijnen zijn gegeven door $a \wedge b$ en $c \wedge d$. De lijnen snijden elkaar iff

$$0 = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 & \gamma_4 \\ \delta_1 & \delta_2 & \delta_3 & \delta_4 \end{vmatrix}$$

Ontwikkel de determinant naar de onderdeterminanten van de beide eerste rijen, dan verkrijgt men $B(p_{ij}, q_{ij})$,

In $V(6, \mathbb{F})$ is de vorm $B(p_{ij}, q_{ij})$ een symplectische vorm. In termen van $PG(5, \mathbb{F})$ zegt de stelling dat twee lijnen in $PG(3, \mathbb{F})$ snijden wanneer de corresponderende punten op de Klein kwadriek verbonden zijn door een op Ω^+ liggende lijn.

($\langle p \rangle \in \Omega^+$, $\langle q \rangle \in \Omega^+$, dan $\langle p, q \rangle \in \Omega^+$ iff $B(p, q) = 0$.)

De correspondentie tussen de lijnen van $PG(3, \mathbb{F})$ en de punten van Ω^+ in $PG(5, \mathbb{F})$ kan in beide richtingen worden gebruikt.

Voorbeeld. Op de Klein kwadriek Ω^+ liggen twee soorten projectieve vlakken, namelijk die corresponderend met de lijnen in een vlak, en die corresponderend met de lijnen door een punt in $PG(3, \mathbb{F})$.

Opgave. Hoe gedragen zich deze twee soorten vlakken onderling en wederzijds?

Een lineair complex van lijnen in $PG(3, \mathbb{F})$ is een stelsel lijnen dat in $PG(5, \mathbb{F})$ correspondeert met de doorsnede van de Klein kwadriek Ω^+ en een hypervlak. Een lineair complex wordt bepaald door de pool van zijn hypervlak t.o.v. Ω^+ . Omdat $PO^+(6, \mathbb{F})$ transitief is op de punten van Ω^+ , en ook op de punten $\notin \Omega^+$, hebben wij de volgende standaard vormen voor lineaire complexen:

De pool $(0, 0, 0, 0, 0, 1)$ geeft het speciale lineaire complex, $p_{12} = 0$.

De pool $(0, 0, 1, 0, 0, 1)$ geeft het algemene lineaire complex, $p_{12} + p_{34} = 0$.

Stelling. Een speciaal lineair complex bestaat uit alle lijnen in $PG(3, \mathbb{F})$ die een gegeven lijn snijden.

Bewijs. Het hypervlak van een speciaal lineair complex raakt aan de Klein kwadriek. Het speciale complex bestaat dus uit alle lijnen die de met het raakpunt corresponderende lijn snijden.

Stelling. Een algemeen lineair complex bestaat uit alle lijnen van $PG(3, \mathbb{F})$ die totaal isotroop zijn ten opzichte van een symplectische vorm.

Bewijs. Zonder de algemeenheid te schaden geven wij het complex de standaard vorm

$$0 = p_{12} + p_{34} = x_1 y_2 - x_2 y_1 + x_3 y_4 - x_4 y_3 =: \mathcal{L}(x, y)$$

voor projectieve lijnen $\langle x, y \rangle$. Interpreteer nu $\mathcal{L}(x, y)$ als een symplectische vorm voor $PG(3, \mathbb{F})$.

Opgave. Bewijs dat in $PG(3, \mathbb{F}_q)$ door elk punt $q+1$ lijnen van een algemeen lineair complex gaan en dat die lijnen in een vlak liggen.

Opgave. Waarmee corresponderen de regelscharen van een hyperboloïde in $PG(3, \mathbb{F})$?

5.3. The twisted polarity.

We specialiseren nu tot $\mathbb{F} = GF(q)$, $q = 2^h$, en beschouwen weder om

$$V(4, \mathbb{F}_q) = V = \langle c_1, e_2, e_3, e_4 \rangle,$$

$$V \wedge V = \langle e_2 \wedge e_3, e_3 \wedge e_1, e_1 \wedge e_2, e_1 \wedge e_4, e_2 \wedge e_4, e_3 \wedge e_4 \rangle.$$

V is voorzien van de symplectische vorm

$$[\mathcal{L}(c_i, e_j)] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

en $V \wedge V$ is voorzien van de boven gedefinieerde vorm $B(,)$, die op de basisvectoren werkt volgens

$$B(e_h \wedge e_i, e_j \wedge e_k) = \begin{cases} 1 & \text{als } (h,i,j,k) = \text{permut } (1,2,3,4), \\ 0 & \text{anders.} \end{cases}$$

Het lineaire complex $p_{12} + p_{34} = 0$ wordt in V voorgesteld door de totaal isotrope vlakken t.o.v. $\mathcal{B}(x,y)$, en in $V \wedge V$ door de 5-dimensionale deelruimte W

$$W := \langle e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4, e_1 \wedge e_3, e_2 \wedge e_4, e_1 \wedge e_4, e_2 \wedge e_3 \rangle.$$

Ten opzichte van $B(\ , \)$ heeft W het radicaal

$$\text{rad } W = \langle e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4 \rangle,$$

en $W = (\text{rad } W) \perp V'$, met

$$V' = \langle e_1 \wedge e_3, e_2 \wedge e_4, e_1 \wedge e_4, e_2 \wedge e_3 \rangle.$$

Definieer de lineaire afbeelding (projectie) $\pi : W \rightarrow V$ door

$$\begin{aligned} \pi(\text{rad } W) &= 0, \quad \pi(e_1 \wedge e_3) = e_1, \quad \pi(e_2 \wedge e_4) = e_2, \\ \pi(e_1 \wedge e_4) &= e_3, \quad \pi(e_2 \wedge e_3) = e_4. \end{aligned}$$

Dan induceert π een isometrie tussen V' met $B(\ , \)$ en V met $\mathcal{B}(\ , \)$. Projectief gezien induceert π een bijectie tussen de totaal isotrope lijnen en de punten van de symplectische $PG(3,q)$.

De lijnen door een punt P in $PG(3,q)$ corresponderen met de punten van een projectief vlak op de Klein kwadriek. De totaal isotrope lijnen door P in $PG(3,q)$ corresponderen met de punten van een projectieve lijn op Ω^+ , die onder π wordt geprojecteerd op een totaal isotrope lijn van de symplectische $PG(3,q)$.

Zij \mathcal{L} de verzameling van de totaal isotrope lijnen van de symplectische $PG(3,q)$, en zij \mathcal{P} de verzameling van de punten van $PG(3,q)$. Dan induceert π dus niet alleen een afbeelding $\pi_{\mathcal{L}} : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{P}$, maar ook een afbeelding $\pi_{\mathcal{P}} : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{L}$, en er geldt

$$(P \in \mathcal{L}) \iff (\pi_{\mathcal{L}}(P) \in \pi_{\mathcal{P}}(P)).$$

Wij onderzoeken of $\pi_{\mathcal{L}} \pi_{\mathcal{P}} : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{P}$ aanleiding kan geven tot een "polariteit" tussen \mathcal{P} en \mathcal{L} .
Daartoe berekenen wij eerst $\pi_{\mathcal{L}} \pi_{\mathcal{P}}$.

Zij $x = \sum x_i e_i$, $y = \sum y_i e_i$, $z = \sum z_i e_i$ met
 $\mathcal{B}(x, y) = \mathcal{B}(x, z) = 0$. Wij berekenen

$$\pi_{\mathcal{P}}(\langle x \rangle) = \pi_{\mathcal{L}}(\pi_{\mathcal{L}}(x \wedge y) \wedge \pi_{\mathcal{L}}(x \wedge z)).$$

$$(\pi_{\mathcal{L}}(x \wedge y) \wedge (\pi_{\mathcal{L}}(x \wedge z))) = \mathcal{B}(y, z) [(x_1 x_2 + x_3 x_4)(e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4) + x_1^2 e_1 \wedge e_3 + x_2^2 e_2 \wedge e_4 + x_3^2 e_1 \wedge e_4 + x_4^2 e_2 \wedge e_3].$$

$$\pi_{\mathcal{L}}(\pi_{\mathcal{L}}(x \wedge y) \wedge \pi_{\mathcal{L}}(x \wedge z)) = \mathcal{B}(y, z) [x_1^2 e_1 + x_2^2 e_2 + x_3^2 e_3 + x_4^2 e_4].$$

Hieruit volgt

$$\pi_{\mathcal{L}} \pi_{\mathcal{P}} \langle x_1, x_2, x_3, x_4 \rangle = \langle (x_1^2, x_2^2, x_3^2, x_4^2) \rangle,$$

met andere woorden, $\pi_{\mathcal{L}} \pi_{\mathcal{P}} : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{P}$ is een semilineaire afbeelding ten opzichte van het Frobenius Automorfisme $\varphi : \alpha \mapsto \alpha^2$ van $\text{GF}(2^h)$. Dit bewijst:

Lemma. Voor $\pi_{\mathcal{L}} \pi_{\mathcal{P}} : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{P}$ geldt $\pi_{\mathcal{L}} \pi_{\mathcal{P}} = \varphi$

Lemma. $\text{GF}(2^h)$ bezit een (uniek) automorfisme σ met $\sigma^2 = \varphi$ dan en slechts dan als h oneven is.

Bewijs. Voor $h = 2m+1$ voldoet $\alpha^\sigma = \alpha^{2^{m+1}}$ omdat

$$(\alpha^\sigma)^\sigma = (\alpha^{2^{2m+1}})^2 = \alpha^2.$$

Voor even h is $\text{GF}(4)$ een deellichaam, waarin het kwadraat van elke $\sigma \in \text{Aut GF}(2^h)$ de identiteit induceert.

Stelling. Er bestaat een (unieke) "polariteit" \mathcal{L} -tussen \mathcal{P} en \mathcal{L} , d.w.z. afbeeldingen $\ell_{\mathcal{P}} : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{L}$ en $\ell_{\mathcal{L}} : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{P}$ met $\ell_{\mathcal{P}} \ell_{\mathcal{L}} = 1_{\mathcal{L}}$, $\ell_{\mathcal{L}} \ell_{\mathcal{P}} = 1_{\mathcal{P}}$, in een symplectische $\text{PG}(3, q)$, $q = 2^h$, dan en slechts dan als h oneven is.

Bewijs. Zij h oneven. Voor $\pi_{\mathcal{L}} \pi_{\mathcal{P}} : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{P}$ geldt

$\pi_{\mathcal{L}} \pi_{\mathcal{P}} = \varphi$ en $\varphi = \sigma^2$, $\sigma \in \text{Aut GF}(2^h)$. Definieer

$$\ell_{\mathcal{P}} := \sigma^{-1} \pi_{\mathcal{P}} \quad , \quad \ell_{\mathcal{L}} := \sigma^{-1} \pi_{\mathcal{L}}$$

dan is, omdat $\pi \sigma = \sigma \pi$,

$$\ell_{\mathcal{L}} \ell_{\mathcal{P}} = \sigma^{-1} \pi_{\mathcal{L}} \sigma^{-1} \pi_{\mathcal{P}} = \sigma^{-2} \pi_{\mathcal{L}} \pi_{\mathcal{P}} = \sigma^{-2} \sigma^2 = 1$$

Dit bewijst dat $\ell_{\mathcal{L}}$ en $\ell_{\mathcal{P}}$ elkaars inverse zijn.

Noem $\ell_{\mathcal{P}} = \ell$, dan geldt voorts

$$(P_1 \in \ell(P_2)) \iff (P_2 \in \ell(P_1)).$$

Als h even is, dan bestaat er geen σ , en ook geen polariteit.

Deze $\ell : \mathcal{P} \leftrightarrow \mathcal{L}$ heet de twisted polarity van Tits, vgl. D.E. Taylor's appendix "The geometry of the Klein quadric" in [9]; zie ook [4] en de volgende paragraaf.

5.4. Ovoiden.

Een ovoïde is een verzameling van q^2+1 punten in $\text{PG}(3, \mathbb{F}_q)$ waarvan geen drietal op een lijn ligt. Een voorbeeld van een ovoïde is een elliptische kwadriek. Analooq aan de stelling van Segre geldt (Barlotti):

Stelling. In $\text{PG}(3, \mathbb{F}_q)$, q oneven, is elke ovoïde een elliptische kwadriek.

Wij beperken ons verder tot $\text{PG}(3, \mathbb{F}_q)$, $q=2^h$. Zij M een maximale verzameling van q^2+m punten waarvan geen drietal op een lijn ligt. $\text{PG}(3, 2)$ heeft maximale M van 8 punten, namelijk de punten buiten een vlak. Voor $q=2^h$, $h > 1$ geldt echter het volgende.

Stelling. In $PG(3, \mathbb{F}_q)$, $q = 2^h$, $h > 1$ is een maximale verzameling een ovoïde (dus $m=1$).

Bewijs. Zij $P \in M$, M een maximale verzameling. Wij bewijzen eerst dat er een tangent door P bestaat. Stel dat elke lijn door P secant is, dan heeft M q^2+q+2 punten, $\binom{q^2+q+2}{2}$ secanten en geen tangenten. Maar het totaal aantal lijnen van $PG(3, \mathbb{F}_q)$ is

$$(q^2+1)(q^2+q+1) > \binom{q^2+q+2}{2}$$

dus er is een passant, zeg l . De vlakken door l snijden M in 0 of $q+2$ punten, dus $q+2$ is een deler van

$$q^2+q+2 = (q+2)(q-1) + 4$$

en $q=2$, tegenspraak.

Zij t een tangent door P aan M . Van de $q+1$ vlakken door t heeft tenminste één, zeg π , met M de $q+1$ punten van een ovaal gemeen. Inderdaad, $q+2$ punten kan niet omdat er dan geen tangenten zijn, en als alle vlakken $\leq q$ punten van M zouden hebben, dan zou M

$$\leq 1 + (q+1)(q-1) = q^2 < q^2 + m$$

punten hebben. Zij N de nucleus van de ovaal in π . Elke lijn door N in π snijdt de ovaal dus in één punt. Voorts gaat door N tenminste één secant $s \notin \pi$, anders zou M niet maximaal zijn. Elk vlak door s snijdt M in ten hoogste $q+1$ punten (niet in $q+2$ omdat er een tangent in π is). Maar dan levert

$$m+q^2 \leq 2 + (q+1)(q-1)$$

dat $m=1$. Voorts heeft elk vlak door de secant s precies $q+1$ punten van M .

Stelling. Zij \mathcal{O} een ovoïde in $PG(3, q)$, $q=2^h$, $h > 1$.
 Elk vlak snijdt \mathcal{O} in 1 of $q+1$ punten. Er zijn
 q^2+1 raakvlakken en q^3+q snijvlakken.

Bewijs. Net als in de vorige stelling nemen wij $P \in \mathcal{O}$,
 een tangent $t \ni P$, een vlak $\pi \ni t$ met $|\pi \cap \mathcal{O}| = q+1$,
 de nucleus N van $\pi \cap \mathcal{O}$, en een secant $s \ni N$. Wij
 weten dat elk vlak door s de ovoïde \mathcal{O} in $q+1$ punten
 snijdt. Zij $Q \in \mathcal{O} \setminus \pi$. Dan is NQ een secant van \mathcal{O} .
 Inderdaad, de doorsnede van \mathcal{O} met het vlak σ door s
 en NQ is een ovaal, waarvoor $\sigma \cap \pi$ een tangent, en s
 een secant is, dus waarvoor N niet de nucleus is. Elk
 vlak door t heeft dus ofwel slechts P , ofwel $q+1$ pun-
 ten met \mathcal{O} gemeen. Er zijn dus q snijvlakken en precies
 één raakvlak door t . Dit geldt voor elk punt $P \in \mathcal{O}$,
 en de bewering volgt.

Stelling. Zij \mathcal{O} een ovoïde in $PG(3, q)$, $q=2^h$, $h > 1$.
 Door $P \in \mathcal{O}$ gaan $q+1$ tangenten; deze
 liggen in een vlak.

Bewijs. K is maximaal, dus er is een secant s door P .
 In elk van de $q+1$ vlakken door s heeft P precies
 één tangent. Twee tangenten door P bepalen een vlak
 en dus een ovaal, waarvan P de nucleus is. Buiten
 de tangenten aan deze ovaal heeft P dus geen andere
 tangenten.

Ten opzichte van een ovoïde K in $PG(3, q)$, $q=2^h$,
 bestaat de volgende correlatie. Een raakvlak corres-
 pondeert met zijn raakpunt. Een snijvlak correspon-
 deert met de nucleus van zijn snijovaal; dan corres-
 pondeert een punt $P \notin K$ met het vlak van zijn
 tangenten aan K .

Stelling. De zojuist beschreven correlatie is een symplectische polariteit.

Bewijs. Als P en π corresponderen, dan geldt $P \in \pi$ en de tangenten in π zijn de lijnen door P . Als ook P' en π' corresponderen, dan geldt

$$(P \in \pi') \iff (P \cup P' = \pi \cap \pi') \iff (P' \in \pi),$$

dus de correlatie is een polariteit van het symplectische type.

De totaal isotrope lijnen ten opzichte van de gevonden symplectische polariteit zijn de tangenten aan de ovoïde. Er zijn $(q+1)(q^2+1)$ tangenten, en evenveel punten in $PG(3,q)$. Door een punt gaan $q+1$ tangenten, en elke tangente bevat $q+1$ punten. Noem \mathcal{P} de verzameling der punten, en \mathcal{L} de verzameling der tangenten. In § 5.3. hebben wij aangetoond dat voor h oneven (en slechts dan) er een (unieke) twisted polarity $e: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{L}$ met $e^2=1$ bestaat, geconstrueerd met behulp van het unieke automorfisme σ van $GF(2^h)$ dat voldoet aan $\sigma^h = \varphi$. De ovoïde is de verzameling van de q^2+1 punten die op hun e -beeld liggen. Deze ovoïde heet de Tits-ovoïde. De tangenten die hun e -beeld bevatten vormen een spread van $PG(3,q)$. Dit heeft een aantal gevolgen.

Gevolg. In verband met de in § 3.7. genoemde stelling van André geeft de spread bestaande uit de q^2+1 tangenten aan de Tits-ovoïde aanleiding tot de constructie van een eindig translatievlak van de orde 2^{4r+2} , voor elke $r \geq 1$, zie [15] § 12.

Gevolg. Voor $q \geq 8$ zijn de Tits-ovoïden geen kwadrieken. Inderdaad, het volgende is niet bijzonder moeilijk aan te tonen (zie [9], appendix § 8. of [15] § 1.).

In $PG(3,q)$ worden affiene coördinaten ingevoerd:

$x = x_3/x_1$, $y = x_4/x_1$, $z = x_2/x_1$. Dan bestaat de Tits-ovoïde uit het oneigenlijke punt van de z -as en de q^2 punten

$$\{(x,y,z) \mid z = xy + x^{2+\sigma} + y^\sigma\}.$$


Reeds voor $q=8$ levert dit een ovoïde die geen kwadriek is.

Gevolg. De groep der automorfismen van de Tits-ovoïde is de Suzuki groep $Sz(q)$ van de orde $(q^2+1)q^2(q-1)$. Deze groep werkt 2-transitief op de Tits-ovoïde. Voor de structuur van $Sz(q)$, zie [9] appendix, [15] en J. Tits, Ovoides et groupes de Suzuki, Archiv. Math. 13 (1962), 187-198.

5.5. Möbius meetkunde.

Een Möbius vlak (\mathcal{P}, Γ) is een verzameling \mathcal{P} van punten, en een collectie Γ van deelverzamelingen (zeg cirkels), zodat geldt:

- (i) elk drietal punten ligt op één cirkel,
- (ii) er zijn vier punten niet op een cirkel,
- (iii) $\forall p, q \in \mathcal{P} : \exists \gamma \in \Gamma : p \in \gamma, q \notin \gamma \exists ! \delta \in \Gamma : (p \in \delta, q \in \delta, \gamma \cap \delta = \{p\})$.



Voorbeeld. De punten en de cirkels van een sfeer in \mathbb{R}^3 voldoen aan de axiomas. Stereografische projectie vanuit $N \in$ sfeer geeft de punten, lijnen en cirkels van het Euclidische vlak. Wanneer slechts de cirkels door N worden beschouwd, dan geeft stereografische projectie de punten en lijnen van het Euclidische vlak, en wordt (iii) het axioma van Euclides.

Voorbeeld. Zij \mathcal{P} de verzameling van de punten van een ovoïde in $PG(3, \mathbb{F}_q)$. Zij Γ de collectie van de snijvlakken van de ovoïde (dus niet de raakvlakken). Dan vormt (\mathcal{P}, Γ) een Möbius vlak. Zij $P \in \mathcal{P}$ een vast punt van de ovoïde, met raakvlak π . De lijnen $\notin \pi$ door P , en de vlakken $\neq \pi$ door P vormen een Desargues affien vlak.

Voorbeeld. Beschouw het "complexe" vlak $GF(q^2) \cup \{\infty\}$ met conjugatie — en zelfgeconjugeerde $GF(q)$. De elementen van het complexe vlak en de cirkels

$$\{z \in GF(q^2) \mid pz\bar{z} + \bar{q}z + q\bar{z} + r = 0; p, r \in GF(q)\}$$

vormen een Möbiusvlak. De Möbius transformaties

$$z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}, \quad ad - bc = 1,$$

voeren cirkels in cirkels over.

Opgave. De punten en de blokken van een $3-(n^2+1, n+1, 1)$ design vormen een Möbius vlak.

Wij keren terug tot de definitie van een Möbius vlak

(\mathcal{P}, Γ) .

Stelling. Zij Λ het deel van Γ dat bestaat uit alle cirkels door een vast punt $N \in \mathcal{P}$. Dan is $(\mathcal{P} \setminus \{N\}, \Lambda)$ een affien vlak.

Opgave. Bewijs deze stelling.

Wij weten dat een affien vlak niet Desargues hoeft te zijn. Dat is wel zo wanneer het Möbius vlak kwadrikaal (afkomstig van een elliptische kwadriek in $PG(3, \mathbb{F})$) of ovoidaal (afkomstig van een ovoïde in $PG(3, \mathbb{F})$) is. In de Möbius meetkunde tracht men ovoidale en kwadrikale Möbius vlakken te karakteriseren door meetkundige eigenschappen van de cirkels.

Stelling. Een Möbius vlak is kwadrikaal dan en slechts dan als de stelling van Miquel geldt. Voor dit resultaat van van der Waerden en Smid (1935) zie [4] Ch. 6, en ook

J.H. van Lint, Möbius vlakken, M.C. vakantiecursus 1978.

Stelling. Een Möbius vlak is ovoidaal dan en slechts dan als de bundelstelling geldt.

Voor de bundelstelling zie [4] . Van der Waerden en Smid (1935) bewezen \Rightarrow , en J. Kahn (nog niet gepubliceerd) bewees \Leftarrow . Omdat een elliptische kwadriek een ovoïde is, en omdat er ovoïden bestaan die geen kwadriek zijn (zie 5.4.), impliceert de stelling van Miquel de bundel stelling, maar niet omgekeerd (vergeleijk het gedrag van de stellingen van Pappus en Desargues). Voor verdere resultaten zie [4] Ch. 6 .

Analoog aan de Möbius meetkunde worden de meetkunden van Minkowski en van Laguerre gedefinieerd. Wij volstaan met een eenvoudig model, en verwijzen verder naar H. Halder - W. Heise, Einführung in die Kombinatorik (1976), Kapitel 12 .

Voorbeeld. Zij Ω een hyperbolische kwadriek of een kwadratische kegel in $PG(3,q)$. Zij Σ de verzameling der vlakken in $PG(3,q)$, die met Ω tenminste twee punten, maar geen rechte gemeen hebben. Dan is (Ω, Σ) een Minkowski meetkunde als Ω een hyperboloïde is, en een Laguerre meetkunde als Ω een kegel is. Stereografische projectie vanuit een punt $N \in \Omega$ levert een $(q-1,q)$ - net, respectievelijk een (q,q) - net (zie 3.3. en ga na) .

5.6. Hjelmslev en Klingenberg vlakken.

Projectieve Hjelmslev en Klingenberg vlakken (we schrijven H-vlakken en K-vlakken) zijn generalisaties van projectieve vlakken.

Definitie. Een K-vlak is een incidentiestructuur (met punten en lijnen) met een equivalentie relatie (z.g. burenelatie) op de punten en op de lijnen, zo dat

- (i) door twee punten die niet buur zijn gaat precies één lijn ;
- (ii) twee lijnen die niet buur zijn snijden elkaar in precies één punt ;
- (iii) definiëren we een buurt (= equivalentieklasse) van punten incident met een buurt van lijnen wanneer een punt uit die buurt van punten ligt op een lijn uit die buurt van lijnen, dan is de incidentie structuur op de buurten een projectief vlak.

Definitie. Een H-vlak is een K-vlak dat aan de volgende twee eisen voldoet:

- (iv) door twee punten die buur zijn gaan tenminste twee lijnen ;
- (v) twee lijnen die buur zijn snijden elkaar in tenminste twee punten.

Laat K een eindig K-vlak zijn. Dan bezit K een aantal mooie regulariteits eigenschappen (zie [Kleinfeld] of [Drake & Lenz]).

Stelling. Voor elk eindig K-vlak bestaan er getallen r en t zo dat

- (i) elke buurt bevat precies t^2 elementen,
- (ii) een lijn door een punt p bevat precies t burenen van p ,

- (iii) door een punt op een lijn L gaan precies t buren van L ,
- (iv) r is de orde van het bijbehorende projectieve vlak,
- (v) $r \leq t$, tenzij $t=1$ (maar dan is het K -vlak een gewoon projectief vlak).

Gevolg. K heeft $t^2(r^2+r+1)$ punten en evenveel lijnen. Elke lijn bevat $t(r+1)$ punten en door elk punt gaan $t(r+1)$ lijnen.

De buurten geven aanleiding tot een partitie van de incidentiematrix A van K :

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & \dots & A_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix} \quad \text{met } n = r^2 + r + 1.$$

Opgave. Laat zien dat A voldoet aan

- (i) $A_{ik} A_{jk}^T = J$ als $A_{ik} \neq 0 \neq A_{jk}$, $i \neq j$;
- (ii) $A_{ki}^T A_{kj} = J$ als $A_{ki} \neq 0 \neq A_{kj}$, $i \neq j$;
- (iii) de $n \times n$ matrix \tilde{A} , gedefinieerd door

$$(\tilde{A})_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{als } A_{ij} = 0, \\ 1 & \text{als } A_{ij} \neq 0, \end{cases}$$

is de incidentie matrix van een projectief vlak;

- (iv) A_{ij} heeft afmeting $t^2 \times t^2$;
- (v) $A_{ij} J = A_{ij}^T J = tJ$ als $A_{ij} \neq 0$.

Omgekeerd is een gepartitioneerde $(0,1)$ -matrix die aan (i), (ii) en (iii) voldoet de incidentie matrix van een K -vlak. Hiermee is eenvoudig in te zien dat de onder gedefinieerde matrix de incidentie-matrix is van een eindig K -vlak met parameters $r = t = 2$.

cykel $(T_1, T_2, 0, T_3, 0, 0, 0)$

waarbij

$$T_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, T_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, T_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

en 0 is de 4×4 0 -matrix.

Ga na dat dit K -vlak een H -vlak is.

De volgende constructie is klassiek: Zij $F(i)$ een commutatieve associatieve algebra over een eindig lichaam F zo, dat $1, i, \dots, i^{k-1}$ lineair onafhankelijk zijn en $i^k = 0$. De deelalgebra N van nuldelers wordt opgespannen door $1, \dots, i^{k-1}$, en $K \setminus N$ is de groep der eenheden. Twee vectoren x en y uit $F(i)^3 \setminus N^3$ heten equivalent als er een eenheid e is zo dat $x = ey$. Punten en lijnen van het H -vlak zijn de equivalentie-classes van vectoren uit $F(i)^3 \setminus N^3$. Een punt x ligt op de lijn y als $x^T y = 0$.

Merk op dat voor $k=1$ dit de klassieke constructie is van een projectief vlak.

Voorbeeld. Kies $F = \mathbb{F}_2$, $F(i) = \{0, 1, i, i+1\}$ met $i^2 = 0$ dan is $k=2$, $N = \{0, i\}$ en $F(i) \setminus N = \{1, 1+i\}$. De constructie levert dan weer het al eerder gekonstrueerde K -vlak met parameters $r=t=2$.

We weten dat het bestaan van een projectief vlak van de orde r equivalent is met het bestaan van $r-1$ MOLS(r) (= onderling orthogonale Latijnse vierkanten). Drake & Lenz bewezen het analogon hiervan voor K -vlakken.

Stelling. Een eindig K -vlak met parameters r en t bestaat dan en slechts dan als er $r-1$ MOLS van de orde r en van de orde t bestaan.

Opgave. Bewijs het "slochts dan" gedeelte van deze stelling.

Hint: kies een buurt van punten P en een lijn L die niets met P gemeen heeft. Kies vervolgens op L een verzameling Q van $r+1$ punten die onderling geen buur lijn. Beschouw de incidentie structuur gevormd door P en alle lijnen die een punt van P en een punt van Q bevatten.

Litteratuur.

[4] , appendix ;

[Drake & Lenz] , Finite Klingenberg planes , Abh. Math. Sem. Hamburg 44, 70-83.

[Kleinfeld] , Finite Hjelmslev planes , Ill J. Math. 3, 403 - 407.

[Klingenberg] , Projective und affine Ebenen mit Nachbarelementen, Math. Z. 60, 384 - 406 .

Literatuurlijst Eindige Meetkunde .

1. E. Artin , Geometric Algebra (1957) .CDW 57
2. R. Baer , Linear algebra and projective
geometry (1952) CDW 52
3. L.M. Blumenthal , A modern view of
geometry (1961) CFB 61
4. P. Dembowski , Finite geometries (1968) CHM 68
5. K.W. Gruenberg - A.J. Weir , Linear
geometry CDW 67
6. M. Hall , The theory of groups (1959) CDN 59
7. M. Hall , Combinatorial theory (1967) CHD 67
8. R. Hartshorne , Foundations of projective
geometry (1967) CFH 67
9. D.G. Higman , Classical groups , TH-Report 78-WSK-04
10. J.W.P. Hirschfeld , Projective geometries
over finite fields (1979) -
11. D.R. Hughes - F.C. Piper, Projective planes
(1973) CFH 73
12. I. Kaplansky , Linear algebra and geometry
(1974) CDX 74
13. S. Lang , Algebra (1969) CDB 65
14. J.H. van Lint , Combinatorial theory
seminar THE (1974) CHE 74
15. H. Lüneburg , Die Suzukigruppen und ihre
Geometrien (1965) CDP 65

16. H. Lüneburg, Transitive erweiterungen endlicher permutationsgruppen ('69) CDP 69
17. T.G. Ostrom, Finite translation planes, Springer Lecture notes 158 (1970) CFH 70
18. T.G. Room - P.B. Kirkpatrick, Miniquaternion geometry (1971) CFH 71
19. J.J. Seidel, On two-graphs, and Shult's characterization of symplectic and orthogonal geometries over $GF(2)$, TH-Report 73-WSK-02.
20. O. Tamaschke, Projective Geometrie I,II CFH 71
21. J. Tits, Buildings of spherical type and finite BN pairs (1974) CDN 74

INDEX

- 9 affiene meetkunde
 24 affien vlak
 73 algemeen lineair complex
 16 algemene lineaire groep
 40 alternerende bilineaire vorm
 61 Arf invariant
 20 Baer subvlak
 41 basis (symplectische)
 39 bilineaire vorm
 40 " (alternerend)
 " (hermiets)
 " (symmetrisch)
 7 Brianchon (stelling van)
 18 Bruck Ryser (" ")
 83 bundelstelling
 67 cocktailparty graaf
 15 Coll.
 15 collineatie
 15 " (centrale)
 52 conjugatie
 38 correlatie
 63 cotriangle property
 6 Dandelin (zeshoek van)
 8 deelruimte
 1 Desargues (configuratie)
 2 " (stelling van)
 17 dilatatie
 31 division ring
 9 3-ruimte
 4, 15 elatie
 35 elementair Abelse groep
 23 evenwijdig
 12 flat
 18 $\text{Fix}(\sigma)$
 77 Frobenius automorfisme
 41 Gram matrix
 40 Hermietse bilineaire vorm
 55 Hermite oppervlak
 " kromme, verzameling
 85 Hjelmslev vlak
 45 hyperbolische 2-dimensionale deelruimte
 41 hyperbolisch vlak
 9 hypervlak
 42, 47 index
 42 isometrie
 38 isotroop (totaal, niet-)
 73 Klein kwadriek
 85 Klingenberg vlak
 22 k-vector
 44 kwadratische vorm
 48 kwadriek (elliptische, hyperbolische)
 83 kwadrikaal
 84 Laguerre meetkunde
 9 lattice (atomair, gecomplementeerd, modulair)
 22 latijns vierkant
 26 lineair affien vlak
 43, 73 lineair complex (algemeen, speciaal)
 67 lineaire deelruimte (van een prepolaire ruimte)
 16 lineaire groep (algemeen, speciaal)
 29 loop
 9 magere projectieve ruimte
 84 Minkowski meetkunde
 83 Miquel (stelling van)
 82, 83 Möbius meetkunde
 " transformatie
 " vlak
 20 Moufang vlak
 32 near field
 23 net
 38 niet-isotroop
 39 niet-ontaard
 67 niet-ontaarde prepolaire ruimte
 52 norm
 69 nucleus
 43 nulpolariteit
 24 oneigenlijke lijn (punt)
 39 (niet-) ontaard
 18 orde van een proj. vlak
 22 orthogonal array
 50, 62 orthogonale groep
 22 " latijnse vierk.
 44, 59 " meetkunde
 40 " polariteit
 69 ovaal
 83 ovoidaal (Möbius vlak)
 78 ovoïde

5 Pappus (stelling van)	21 Singer cycle
5 Pascal (stelling van)	" matrix
8 Pasch (axioma van)	64 singuliere kwadratische vorm
69 passant	73 speciaal lineair complex
58 perfect	16 speciale lineaire groep
22 plaats	14 spread
72 Plücker coördinaten	47 standaard vorm (van een kwadratische vorm)
38 polariteit	82 Suzuki groep
40 " (orthogonale)	40 symmetrische bilineaire vorm
" (symplectische)	41 symplectische basis
" (unitaire)	42,62 " groep
49 poolvlak	40 " polariteit
67,68 prepolaire ruimte	69 tangent
4 prisma eigenschap	29 ternaire ring
51 projectieve groep	81 Tits ovoïde
" (orthogonale)	38 totaal isotroop
43 " (symplectische)	52 trace
57 " (unitaire)	19 (C,a)-transitief
9 projectieve meetkunde	34 translatie
8 " ruimte	35 " groep
18 projectief vlak	35 " vlak
4 pyramide eigenschap	31 " vlak (affien)
31 quasi field	17 transvectie
64 Qvist (stelling van)	22 transversal design
49 raakvlak	62 triangle property
41 radicaal	75,78 twisted polarity
44 rang 3 graaf	57 unitaire groep
67 rang van een prepolaire ruimte	52 " meetkunde
68 rang van een polaire ruimte	40 " polariteit
40 reflexief	53 " ruimte
36 ring der endomorfismen	57 unital
9 rooster	36 vectorruimte
31 scheef lichaam	10 vlag
69 secant	9 vlak
31 semi field	41 vlak (hyperbolisch)
16 semilineaire afbeelding	42 Witt (stelling van)
39 sesquilineaire vorm	
45 signatuur (van een kwadratische vorm)	